



УДК 582.893:061.62:374.4(571.16-25)

## Два лектотипа из семейства *Ariaceae* Lindl. в Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК)

И.И. Гуреева<sup>1</sup>, М.Г. Пименов<sup>2</sup>, В.Ф. Балашова<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Томский государственный университет, Томск, Россия; gureyeva@yandex.ru,  
vf-balashova@yandex.ru

<sup>2</sup>Московский государственный университет, Москва, Россия; mgpimenov@mail.ru

В фонде Гербария им. П.Н. Крылова обнаружены типовые образцы 2 видов семейства *Ariaceae* Lindl., не выявленные ранее. Проведена лектотипификация их названий, избраны лектотипы.

Ключевые слова: *Ariaceae*, лектотипификация, Гербарий им. П.Н. Крылова.

В 2015 г. опубликован аннотированный список типовых образцов 26 таксонов семейства *Ariaceae* Lindl., хранящихся в Гербарии им. П.Н. Крылова Томского государственного университета (ТК) (Гуреева, Балашова, 2015). Однако недавно были обнаружены образцы ещё 2 видов этого семейства, являющиеся типовыми: описанная Е.П. Коровиным и опубликованная Н.В. Павловым во «Флоре Центрального Казахстана» (Павлов, 1935) *Ferula potaninii* Korovin ex Pavlov и описанный П.Н. Крыловым *Peucedanum salsugineum* Krylov (Krylov, 1903).

*Ferula potaninii* не была формально описана до публикации «Флоры Центрального Казахстана» (Павлов, 1935). Но и в ней для вида не даётся развёрнутого описания, признаки приведены кратко в ключе для определения, имеется примечание о том, что название, данное Е.П. Коровиным, является *nomen nudum*. В 1947 г. Е.П. Коровиным опубликована «Иллюстрированная монография рода *Ferula* (Tourn.) L.», где он привёл название вида под своим авторством и дал его развёрнутое описание (Коровин, 1947). Затем в обработке *Ferula* для «Флоры СССР» он же (Коровин, 1951) указал в качестве автора и Н.В. Павлова (*Ferula potaninii* Korovin ex Pavlov). Что касается типовых образцов, Н.В. Павлов (1935) ссылается на эксикату «Herbarium Flora Asia Media», но в более поздних трудах самого автора вида Е.П. Коровина (1947, 1951) имеется указание на то, что тип вида хранится в Томске. Обнаруженные нами в ТК образцы определены и подписаны самим Е.П. Коровиным.

*Peucedanum salsugineum* описан П.Н. Крыловым по сборам из Восточного Алтая «in salsis deserti Tschujensis (Altai orientalis)» (Krylov, 1903, с. 8). В вышедшей в том же году «Флоре Алтая и Томской губернии» (Крылов, 1903) местонахождения вида цитируются на русском языке и более подробно, чем в протологе, но скорее всего по тем же материалам: «на солончаках в Чуйской степи в западной её части и в 25 верстах от Кош-Агача выше по р. Чуе, с цветками и почти зрелыми плодами в конце июля. Более пока нигде не известно» (с. 530). В 1935 г., уже после смерти П.Н. Крылова, Н.П. Иконников-Галицкий, сравнивая *Peucedanum salsugineum* с описанным Н.С. Турчаниновым из Монголии *Peucedanum falcaria* Turcz., пришёл к выводу, что эти 2 вида неотличимы друг от друга, и П.Н. Крылов описал новый вид, «вероятно, совершенно не зная о существовании диагноза Турчанинова» и даже «рисунок, изображающий *Peucedanum salsugineum*, приложенный к работе П.Н. Крылова, имеет очень много сходства с аутентичными экземплярами Турчанинова» (Иконников-Галицкий, 1935, с. 2). В опубликованном в том же году 8-м томе «Флоры Западной Сибири» (Крылов, 1935), как и в более поздней обработке рода для «Флоры СССР» (Шишкин, 1951), этот вид сведён в синонимы к *Peucedanum falcaria* Turcz.

Ниже приведены цитаты типовых образцов *Ferula potaninii* и *Peucedanum salsugineum*, хранящихся в Гербарии им. П.Н. Крылова Томского государственного университета (ТК), избраны лектотипы.

1. *Ferula potaninii* Korovin ex Pavlov, 1935, Фл. Центр. Казахстана, 2: 532, 537. – *Ferula potaninii* Korovin, 1947, Иллюст. моногр. рода *Ferula*: 56, tab. 30, fig. 2.

Lectotypus et isolectotypi (2) (hoc loco!): «Тарбагатай и его окрестности. Собр. Г.Н. Потанин»; «Хобор Асу, на дресвяной почве. 20 июня» (Lectotypus ТК-000862, isolectotypi ТК-000863, ТК-000864) (Sub nom. *Ferula potaninii* Eug. Kor. sp. n. Determ. Eug. Korovin).

По протологу: «Встречается в предгорьях Тарбагатай и на прилежащих пустынных равнинах» (Павлов, 1935). «Area geogr. Asia Media, montes Tarbagataj; fl. VI. – Typus: Potanin l.c. in Tomsk» (Коровин, 1947).

Примечание. На образцах имеется по 2 этикетки: одна из них печатная, изготовленная в Гербарии после поступления коллекции – «Тарбагатай и его окрестности. Собр. Г.Н. Потанин» без указания даты и конкретного места сбора, другая – черновая рукописная, написана карандашом, по-видимому, Г.Н. Потаниным; на ней указано место сбора – «Хобор Асу» и дата «20 июня». Обе этикетки без указания года.

2. *Peucedanum salsugineum* Krylov, 1903, Тр. Имп. С.-Пб. бот. сада., 21(1): 8–9, tab. 5, fig. 1.

Lectotypus et isolectotypi (2) (hoc loco!): «Алтай. Чуйская степь в северо-западн. конце. 27–28 июля 1901. П. Крылов» (Lectotypus ТК-000876, isolectotypi ТК-000877) (Sub. nom. *Peucedanum salsugineum* Kryl. n. sp.).

Syntypus: «Алтай. Верховье р. Чуи, в 20 верст. выше Кош-Агача, солонцев. степь. 26 июля 1901. П. Крылов» (ТК-000878) (Sub. nom. *Peucedanum salsugineum* Kryl. n. sp.).

По протологу: «Habitat in salsis deserti Tschujensis (Altai orientalis); cum floribus et fructibus ad finem Julii collectum est».

Примечание. Все образцы подписаны П.Н. Крыловым собственноручно.

## БЛАГОДАРНОСТИ

Статья подготовлена в рамках научного проекта, выполняемого при поддержке Программы «Научный фонд имени Д.И. Менделеева Томского государственного университета» по направлению «Наука в Сибири и о Сибири» («TSSW»).

## ЛИТЕРАТУРА

- Гуреева И.И., Балашова В.Ф. Типовые образцы Apiaceae Lindl. в Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК) // Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. 2015. № 112. С. 3–13.
- Иконников-Галицкий Н.П. Несколько слов о том, что такое *Peucedanum salsugineum* Kryl. // Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. 1935. № 5. С. 2–3.
- Коровин Е.П. Иллюстрированная монография рода *Ferula* (Tourn.) L. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1947. 140 с.
- Коровин Е.П. Род 1052. Ферула – *Ferula* L. // Флора СССР. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. Т. 17. С. 62–155.
- Крылов П.Н. 199. *Peucedanum* L. // Флора Алтая и Томской губернии: в 7 т. Томск, 1903. Т. 1. С. 526–532.
- Крылов П.Н. *Peucedanum* L. // Флора Западной Сибири: в 12 т. Томск, 1935. Т. 8. С. 2045–2052.
- Павлов Н.В. Флора Центрального Казахстана: в 3 ч. М., 1935. Ч. 2. 550 с.
- Шишкин Б.К. (ред.). Род 1062. Горичник – *Peucedanum* L. // Флора СССР: в 30 т. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. Т. 17. С. 168–203.
- Krylov P.N. Plantae altaicae novae I. // Тр. Имп. С.-Пб. бот. сада. 1903. Т. 21, вып. 1. С. 3–12.

Поступила 07.04.2016; принята 11.06.2016



Systematic notes ..., 2016, 113: 37–40  
DOI: 10.17223/20764103.113.3

## Two lectotypes from the Apiaceae Lindl. in the P.N. Krylov Herbarium (TK)

I.I. Gureyeva<sup>1</sup>, M.G. Pimenov<sup>2</sup>, V.F. Balashova<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Tomsk State University, Tomsk, Russia; gureyeva@yandex.ru, vf-balashova@yandex.ru

<sup>2</sup>Moscow State University after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia; mgpimenov@mail.ru

### Abstract

The type specimens of two species of Apiaceae Lindl. – *Ferula potaninii* Korovin ex Pavlov and *Peucedanum salsugineum* Krylov, – are found in the collections of P.N. Krylov Herbarium. Lectotypes of the both species are designated here: *Ferula potaninii* Korovin ex Pavlov – “Tarbagatai and its vicinities. Collected by G.N. Potanin; Khobor-Asu, on the grussy soil. 20 June” (TK-000862), and *Peucedanum salsugineum* Krylov – “The Altai. Chuiskaya steppe in the north-west end. 27–27 June 1901. P. Krylov” (TK-000875).

**Key words:** Apiaceae, lectotypification, P.N. Krylov Herbarium (TK).

**Founding:** Supported by the Program ‘D.I. Mendeleev Scientific Fund’ of the Tomsk State University (TSSW).

## REFERENCES

- Gureyeva I.I., Balashova V.F. 2015. The type specimens of Apiaceae Lindl. in the P.N. Krylov Herbarium (TK). *Sistematicheskie zametki po materialam Gerbariya imeni P.N. Krylova Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University], 112: 3–13. [In Russian].
- Ikonnikov-Galitskiy N.P. 1935. Some words about, what it is *Peucedanum salsugineum* Kryl. *Sistematicheskie zametki po materialam Gerbariya imeni P.N. Krylova Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University], 5: 2–3. [In Russian].
- Korovin E.P. 1947. *Illustrirovannaya monografiya roda Ferula (Tourn.) L. [Generis Ferula (Tourn.) L. monographia illustrata]*. Tashkent: AS UzSSR Publ. 140 p. [in Russian with Latin descr.].
- Korovin E.P. 1951. Genus 1052. *Ferula* L. In: *Flora SSSR [Flora of the USSR]*. Moscow; Leningrad: Academy of Science of USSR Publ., 17: 62–155. [In Russian].
- Krylov P.N. 1903. *Plantae altaicae novae I. Acta horti Petropolitani*, 21(1): 3–12.
- Krylov P.N. 1903. *Peucedanum* L. In: *Flora Altaya i Tomskoi Gubernii [Flora of the Altai and Tomsk province]*. Tomsk, 2: 526–532. [In Russian].
- Krylov P.N. 1935. *Peucedanum* L. In: *Flora Zapadnoi Sibiri [Flora of Western Siberia]*. Tomsk, 8: 2045–2052. [In Russian].
- Pavlov N.V. 1935. *Flora Centralnogo Kazakhstana*. Moscow. Vol. 2. 550 c. [In Russian].
- Shishkin B.K. (ed.) 1951. Genus 1062. *Peucedanum* L. In: *Flora SSSR [Flora of the USSR]*. Moscow; Leningrad: Academy of Science of USSR Publ., 17: 168–203. [In Russian].

*Received 07 April 2016; accepted 11 June 2016*