КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 530.145

DOI: 10.17223/00213411/63/6/170

Г.П. ХАНДОРИН^{1,2}

ПАЛЛАДИЙ И РОДИЙ КАК ВОЗМОЖНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

Ключевые слова: радиоактивный распад, ядерные реакции.

В работе [1] высказано предложение о том, что эффект появления избыточной энергии при электролизе тяжелой воды связан с превращением ионов дейтерия (p^+ , n) в динейтроний (n , n) и последующим синтезом двух динейтрониев в реакциях

Однако взаимодействие электрона с ионом дейтерия, как правило, происходит с образованием атома дейтерия, а реакция $(p^+n) + e \rightarrow n, n$ маловероятна, поскольку ее энергетический барьер составляет примерно 2 МэВ. Те обстоятельства, что исследователи отмечают выделение избыточной энергии преимущественно в процессе электролиза тяжелой воды (D_2O) при использовании в электролизере палладиевого катода, а также то, что катализатором многих химических реакций являются соединения палладия, дают основание рассмотреть механизм преодоления энергетического барьера в вышеупомянутой реакции с точки зрения – не является ли палладий катализатором реакции?

Рассмотрение семейств многочисленных изотопов палладия и родия и их свойств наводит на следующее предположение.

Семейства известных изотопов палладия и родия представлены в таблице (данные из справочника [2], с. 994–1044).

Радиационные характеристики изотопов палладия и родия

Палладий ($_{46}\text{Pd}$)				Родий (Rh)			
A	$T_{1/2}$	Тип распада	Энергия частиц, МэВ	A	$T_{1/2}$	Тип распада	Энергия частиц, МэВ
98	17.7 мин	β^+	2.3	95	5.02 мин	э.з.	-
99	21.4 мин	β^+	2.2	95 m	1.96 мин	э.з., и.п.	-
100	3.63 сут	э.з.	-	96	9.90 мин	β^+	3.3
101	8.47 ч	э.з.	-	96 m	1.51 мин	β^+ , и.п.	-
102	Стабилен	-	-	97	32 мин	β^+	2.1
103	16.96 сут	э.з.	-	98	8.7 мин	β^+	3.5; 2.8
104	Стабилен	-	-	98 m	3.5 мин	β^+	-
105	Стабилен	-	-	99	16 сут	э.з. β^+	- 0.74
106	Стабилен	-	-	99 m	4.7 ч	э.з.	-
107	$6.5 \cdot 10^6$ лет	β^-	0.03	100	20.8 ч	э.з. β^+	- 2.62
107 m	21.3 с	и.п.	-	101	3.3 г.	э.з.	-
108	Стабилен	-	-	101 m	4.34 сут	э.з. и.п.	- -
109	13.46 ч	β^-	1.028	102	2.9 г.	э.з.	-
110	Стабилен	-	-	102 m	207 сут	э.з., и.п. β^+ , β^-	- 1.29; 1.25
111	23.4 мин	и.п.	-	103	Стабилен	-	-
111m	5.5 ч	β^-	0.28	103 m	56.12 мин	и.п.	-
112	21.045 ч			104	42.3 с	β^-	2.44
113	93 с	β^-	-	104 m	4.34 мин	и.п.	-
114	2.4 мин	β^-	-	105	35.36 ч	β^-	0.568
115	41.3 с	β^-	-	105 m	45 с	и.п.	-
116	12.72 с	β^-	-	106	29.8 с	β^-	3.54
117	5.0 с	β^-	-	106 m	130 мин	β^-	1.7
				107	21.7 мин	β^-	1.20
				108	16.8 с	β^-	4.5
				109	80 с	β^-	2.6; 2.3
				110	3.2 с	β^-	5.5
				112	0.8 с	β^-	-
				113	~ 0.91 с	β^-	-
				114	1.68 с	β^-	-

Уважаемые читатели!

Доступ к полнотекстовой версии журнала
«Известия высших учебных заведений. Физика»
осуществляется на платформе
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
на платной основе:

<https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7725>