

Исправление / Corrigendum
doi: 10.17223/25421379/35/14

ИСПРАВЛЕНИЕ В СТАТЬЕ «СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АТАКСОФРАГМИИД (ФОРАМИНИФЕРЫ) ДЛЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»

Вера Михайловна Подобина

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия. podobina@mail.tsu.ru

Опубликована в: Геосферные исследования. 2025. № 1. С. 20–31. doi: 10.17223/25421379/34/2

ERRATUM TO ARTICLE “STRATIGRAPHIC POTENCIAL OF ATAXOPHRAGMIIDA (FORAMINIFERA) FOR CRETACEOUS SEDIMENTS OF WESTERN SIBERIA”

Vera M. Podobina

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, podobina@mail.tsu.ru

Published in: *Geosfernye issledovaniya* – Geosphere Research. 2025. 1. pp. 20–31. doi: 10.17223/25421379/34/2

Среди атаксофрагмийд впервые выявлены роды-двойники, отличающиеся морфологией раковин и химическим составом стенки. Они приурочены к разным типам фаций, доминировали при расширении трансгрессий и имеют стратиграфическое значение.

Из них род *Pseudoverneuilina* Podobina, 2013 оказался в паре с родом двойником *Verneuilina* Orbigny, 1839. В статье автора «Стратиграфический потенциал атаксофрагмийд (фораминиферы) для меловых отложений Западной Сибири» показано, в чем состоит различие этих родов.

Род *Pseudoverneuilina* широко распространён в апт-альбских комплексах фораминифер северного палеобиогеографического района Западно-Сибирской провинции.

Наглядным видом этого рода является *P. albica* Podobina, опубликованный как и род в 2013 году [Подобина, 2013] и далее упомянутый в ряде работ автора. Вид *P. albica* Podobina характерен для датировки альбского возраста во многих разрезах среднего мела северного района, поэтому хотелось повторно его описать и показать изображение на палеонтологической таблице. Однако слова «gen. nov. и sp. nov.» [стр. 21 (раздел Стратиграфическое значение атаксофрагмийд), стр. 24 (раздел Заключение), стр. 29 (подпись в Палеонтологической таблице V, фиг. 4), стр. 29 (текст), стр. 30] оказались лишними, вместо них должно быть написано «Podobina, 2013». Также в палеонтологическом описании [стр. 30] вместо слова, «Голотип» нужно понимать «Паратип».

В целом в статье показана значимость для стратиграфии этой группы фораминифер.

Редакция журнала и автор благодарят читателей за выявленные в статье ошибки.

Оригинальную статью можно найти по doi: 10.17223/25421379/34/2

Внесение исправлений не повлияло на сделанные автором выводы. Исправление было внесено в онлайн-версию статьи.

These errors do not affect the conclusions of the article. The article has been corrected online.

Список источников

Подобина В.М. Биостратиграфия альба Самотлорской площади Западной Сибири (по данным фораминифер) // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 188–198.

References

Podobina V.M. *Biostratigrafiya al'ba Samotlorskoy ploschadi Zapadnoy Sibiri (po dannym foraminifer)* [Biostratigraphy of the Albian of the Samotlor area of Western Siberia (based on foraminifera)] // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* – Tomsk State University Journal. 2013. No. 374. pp. 188–198. In Russian