МАТЕМАТИКА

УДК 517.16; 519.2

Е.А. Пчелинцев

ПРОЦЕДУРА ДЖЕЙМСА – СТЕЙНА ДЛЯ УСЛОВНО-ГАУССОВСКОЙ РЕГРЕССИИ

В статье рассматривается задача оценивания p -мерного ($p \geq 2$) вектора среднего многомерного условно-гауссовского распределения при квадратичной функции потерь. Задача такого типа возникает, например, при оценивании параметров непрерывной регрессионной модели с негауссовским процессом Орнштейна – Уленбека. Предлагается модификация процедуры Джеймса – Стейна вида $\hat{\theta}^*(Y) = (1 - c/\|Y\|)Y$, где Y – наблюдение и $c > 0$ – специальная константа. Для этой оценки найдена явная верхняя граница для квадратического риска и показано, что ее риск строго меньше риска обычной оценки максимального правдоподобия для размерности $p \geq 2$. Эта процедура применяется к проблеме параметрического оценивания непрерывной условно-гауссовской регрессии и к оцениванию вектора среднего многомерного нормального распределения, когда ковариационная матрица неизвестна и зависит от некоторых мешающих параметров.

Ключевые слова: условно-гауссовская регрессия, улучшенное оценивание, процедура Джеймса – Стейна, негауссовский процесс Орнштейна – Уленбека.

Введение

В 1961 г. Джеймс и Стейн, рассматривая задачу оценивания вектора среднего θ p -мерного нормального распределения случайного вектора Y с единичной ковариационной матрицей I_p , ввели оценку

$$\hat{\theta}_{JS} = \left(1 - \frac{p-2}{\|Y\|^2}\right) Y, \quad (1)$$

которая для $p \geq 3$ превосходит оценку максимального правдоподобия

$$\hat{\theta}_{ML} = Y \quad (2)$$

при квадратическом риске

$$R(\theta, \hat{\theta}) = \mathbf{E}_\theta \|\theta - \hat{\theta}\|^2, \quad (3)$$

т.е. для всех значений параметра θ

$$R(\theta, \hat{\theta}_{JS}) < R(\theta, \hat{\theta}_{ML}).$$

Этот неожиданный результат вызвал большой интерес математиков статистики и стимулировал многих авторов к развитию теории улучшенного оценивания. Задача Джеймса – Стейна была изучена для более общих моделей, в том числе с неизвестной ковариационной матрицей [1, 2, 6, 9]. Значительные усилия были направлены на решение задачи улучшенного оценивания в негауссовских моделях.

В [3, 5] были предложены процедуры улучшенного оценивания для регрессии со сферически симметричными распределениями шумов. В [4] изучалась непараметрическая модель регрессии с зависимыми шумами.

Оценки Джеймса – Стейна и другие улучшенные оценки нашли применение в эконометрике и в задачах, связанных с обработкой сигналов.

В статье рассматривается задача оценивания среднего в модели регрессии, в которой шум является только условно-гауссовским. Предположим, что наблюдаемый p -мерный случайный вектор Y удовлетворяет уравнению

$$Y = \theta + \xi, \quad (4)$$

где θ – вектор постоянных параметров из некоторого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$, ξ – условно-гауссовский случайный вектор с нулевым средним и условной ковариационной матрицей $D(\mathcal{G})$, т.е. $\text{Law}(\xi|\mathcal{G}) = \mathcal{N}_p(0, D(\mathcal{G}))$, где $\mathcal{G}$ – некоторая фиксированная σ -алгебра.

Для данной модели исследование оценки Джеймса – Стейна провести не удастся и вопрос о нахождении её риска остается открытым. Предлагается рассмотреть следующую модификацию оценки Джеймса – Стейна:

$$\theta^* = \left(1 - \frac{c}{\|Y\|} \right) Y, \quad (5)$$

где c – положительная константа, определяемая ниже. Основное отличие оценки (5) от (1) в том, что вместо квадрата нормы $\|Y\|^2$ используется норма в первой степени $\|Y\|$. Как показано ниже, оценка θ^* позволяет решать задачу улучшенного оценивания регрессии с условно-гауссовскими шумами при некоторых дополнительных предположениях. В теореме 2.1 раздела 2 устанавливается, что оценка (5) превосходит по точности оценку максимального правдоподобия (2) равномерно по θ для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ и всех размерностей $p \geq 2$. Для сравнения заметим, что преимущество оценки Джеймса – Стейна для гауссовской регрессии проявляется только для $p \geq 3$. В разделе 3 оценка (5) применяется для решения задачи улучшенного параметрического оценивания в непрерывной регрессионной модели с негауссовским шумом, являющимся смесью белого шума и импульсных возмущений, описываемых составным процессом Пуассона. В разделе 4 оценка (5) применяется для оценивания параметра в дискретной регрессионной модели с гауссовским шумом, зависящим от неизвестных мешающих параметров. В приложении приводятся некоторые технические результаты.

2. Верхняя граница для риска оценки

В данном разделе получена верхняя граница для риска оценки (5) при некоторых условиях на случайную ковариационную матрицу $D(\mathcal{G})$.

Предположим, что

(C₁) – минимальное собственное значение матрицы $D(\mathcal{G})$ отделено снизу от нуля, т.е. существует положительная постоянная λ_* , такая, что

$$\lambda_{\min}(D(\mathcal{G})) \geq \lambda_* \quad \text{п.н.};$$

(C₂) – математическое ожидание максимального собственного значения матрицы $D(\mathcal{G})$ ограничено сверху на некотором компакте $\Theta \subset \mathbb{R}^p$, т.е.

$$\sup_{\theta \in \Theta} \mathbf{E}_\theta \lambda_{\max}(D(\mathcal{G})) \leq a^*,$$

где a^* – некоторая положительная постоянная.

Обозначим разность рисков оценок (5) и (2) как

$$\Delta(\theta) := R(\theta, \theta^*) - R(\theta, \hat{\theta}_{ML}).$$

Нам потребуется также следующая константа

$$\gamma_p = \frac{\sum_{j=0}^{d-2} 2^{\frac{j-1}{2}} (-1)^{p-j} (\kappa)^{p-1-j} \Gamma\left(\frac{j+1}{2}\right) - (-\kappa)^p I(\kappa)}{2^{p/2-1} \Gamma(p/2) d},$$

где $\kappa = d/\sqrt{a^*}$, $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{e^{-r^2/2}}{\alpha + r} dr$ и $d = \sup\{\|\theta\| : \theta \in \Theta\}$.

Основной результат для условно-гауссовской регрессии содержит следующая теорема.

Теорема 2.1. Пусть шум ξ в (4) имеет p -мерное условно-гауссовское распределение $\mathcal{N}_p(0, D(\mathcal{G}))$ и его ковариационная матрица $D(\mathcal{G})$ удовлетворяет условиям (C_1) , (C_2) для некоторого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$. Тогда оценка (5) с $c = (p-1)\lambda_*\gamma_p$ доминирует оценку максимального правдоподобия (2) для всех $p \geq 2$, т.е.

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq -[(p-1)\lambda_*\gamma_p]^2.$$

Доказательство. Сначала установим нижнюю границу для математического ожидания случайной величины $\|Y\|^{-1}$.

Лемма 2.2. В условиях теоремы 2.1

$$\inf_{\theta \in \Theta} \mathbf{E}_\theta \frac{1}{\|Y\|} \geq \gamma_p.$$

Доказательство леммы приводится в приложении.

Чтобы получить верхнюю границу для $\Delta(\theta)$, нам потребуется модифицировать доказательство леммы Стейна [9] применительно к модели (4) со случайной ковариационной матрицей.

Рассмотрим риски оценок (2) и (5)

$$R(\hat{\theta}_{ML}, \theta) = \mathbf{E}_\theta \|\hat{\theta}_{ML} - \theta\|^2 = \mathbf{E}_\theta \left(\mathbf{E} \left(\|\hat{\theta}_{ML} - \theta\|^2 \mid \mathcal{G} \right) \right) = \mathbf{E}_\theta \text{tr} D(\mathcal{G});$$

$$R(\theta^*, \theta) = R(\hat{\theta}_{ML}, \theta) + \mathbf{E}_\theta \left[E \left((g(Y) - 1)^2 \|Y\|^2 \mid \mathcal{G} \right) \right] + 2 \sum_{j=1}^d \mathbf{E}_\theta \left[E \left((g(Y) - 1) Y_j (Y_j - \theta_j) \mid \mathcal{G} \right) \right],$$

где $g(Y) = 1 - c/\|Y\|$.

Обозначив $f(Y) = (g(Y) - 1)Y_j$ и используя условную плотность распределения вектора Y относительно σ -алгебры $\mathcal{G}$

$$p_Y(x \mid \mathcal{G}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} \sqrt{\det D(\mathcal{G})}} \exp \left(-\frac{(x - \theta)' D^{-1}(\mathcal{G})(x - \theta)}{2} \right),$$

имеем

$$I_j := \mathbf{E}(f(Y)(Y_j - \theta_j) | \mathcal{G}) = \int_{\mathbb{R}^p} f(x)(x_j - \theta_j) p_Y(x | \mathcal{G}) dx, \quad j = \overline{1, p}.$$

Делая замену переменной $u = D^{-1/2}(\mathcal{G})(x - \theta)$ и полагая $\tilde{f}(u) = f(D^{1/2}(\mathcal{G})u + \theta)$, находим

$$I_j = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} \sum_{l=1}^p \langle D^{1/2}(\mathcal{G}) \rangle_{jl} \int_{\mathbb{R}^p} \tilde{f}(u) u_l \exp\left(-\frac{\|u\|^2}{2}\right) du, \quad j = \overline{1, p},$$

где $\langle A \rangle_{ij}$ обозначает (i, j) -й элемент матрицы A . Эти величины можно переписать как

$$I_j = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^p \mathbf{E}\left(\langle D^{1/2}(\mathcal{G}) \rangle_{jl} \langle D^{1/2}(\mathcal{G}) \rangle_{kl} \frac{\partial f}{\partial u_k}(u) \Big|_{u=Y} | \mathcal{G}\right), \quad j = \overline{1, p}.$$

Таким образом, квадратический риск для оценки (5) представляется в виде

$$R(\theta^*, \theta) = R(\hat{\theta}_{ML}, \theta) + \mathbf{E}_\theta (g(Y) - 1)^2 \|Y\|^2 + \\ + 2\mathbf{E}_\theta \left(\sum_{j=1}^p \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^p \langle D^{1/2}(\mathcal{G}) \rangle_{jl} \langle D^{1/2}(\mathcal{G}) \rangle_{kl} \frac{\partial}{\partial u_k} [(g(u) - 1)u_j] \Big|_{u=Y} \right).$$

После простых преобразований получаем

$$R(\theta^*, \theta) = R(\hat{\theta}_{ML}, \theta) + \mathbf{E}_\theta W(Y),$$

где

$$W(x) = c^2 + 2c \frac{x'D(\mathcal{G})x}{\|x\|^3} - 2trD(\mathcal{G}) \cdot c \frac{1}{\|x\|}.$$

Отсюда разность рисков $\Delta(\theta)$ принимает вид

$$\Delta(\theta) = \mathbf{E}_\theta W(Y).$$

Поскольку $x'Ax \leq \lambda_{\max}(A)\|x\|^2$, приходим к неравенству

$$\Delta(\theta) \leq c^2 - 2c \mathbf{E}_\theta \frac{trD(\mathcal{G}) - \lambda_{\max}(D(\mathcal{G}))}{\|Y\|}.$$

Следовательно,

$$\Delta(\theta) \leq c^2 - 2c \sum_{i=2}^d \mathbf{E}_\theta \frac{\lambda_i(D(\mathcal{G}))}{\|Y\|}.$$

Принимая во внимание условие (C_1) и лемму 2.2, имеем

$$\Delta(\theta) \leq c^2 - 2(p-1)\lambda_*\gamma_p c =: \phi(c_n).$$

Минимизируя функцию $\phi(c)$ по c , приходим к желаемому результату

$$\Delta(\theta) \leq -[(p-1)\lambda_*\gamma_p]^2.$$

Теорема 2.1 доказана.

В отличие от (1), оценку (5) можно использовать для регрессионной модели с зависимыми гауссовскими шумами.

Следствие 2.3. Пусть в (4) шум $\xi \sim \mathcal{N}_p(0, D)$ с положительно определенной неслучайной матрицей $D > 0$ и $\lambda_{\min}(D) \geq \lambda_* > 0$. Тогда оценка (5) с $c = (p-1)\lambda_*\gamma_p$ доминирует оценку максимального правдоподобия для всех $p \geq 2$ и любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$, т.е.

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq -[(p-1)\lambda_*\gamma_p]^2.$$

Замечание. Заметим, что если $D = \sigma^2 I_p$, то

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq -[(p-1)\sigma^2\gamma_p]^2.$$

Следствие 2.4. Если $\xi \sim \mathcal{N}_p(0, I_p)$ и $\theta = 0$ в модели (4), то риск оценки (5) дается формулой

$$R(0, \theta^*) = p - \left[\frac{(p-1)\Gamma((p-1)/2)}{\sqrt{2}\Gamma(p/2)} \right]^2 =: r_p.$$

Применяя формулу Стирлинга для гамма-функции $\Gamma(x) = \sqrt{2\pi}x^{x-1/2}e^{-x}(1+o(1))$, можно проверить, что $r_p \rightarrow 0,5$ при $p \rightarrow \infty$. Поведение риска r_p при малых значениях p представлено на рис. 1. Заметим, что в этом случае риск оценки Джеймса – Стейна является постоянным для всех $p \geq 3$, т.е. $R(\theta, \hat{\theta}_{JS}) = 2$, а риск оценки максимального правдоподобия $\hat{\theta}_{ML}$ равен p и стремится к бесконечности при $p \rightarrow \infty$. Таким образом, оценка (5) для регрессии с единичной матрицей шумов превосходит по точности как оценку максимального правдоподобия, так и оценку Джеймса – Стейна.

Рис. 1. Риск оценки (5) при $\theta = 0$

3. Улучшенное оценивание в негауссовской регрессионной модели

В данном разделе применим предложенную оценку (5) к негауссовской непрерывной регрессионной модели. Пусть наблюдаемый процесс (y_t) описывается уравнением

$$dy_t = \sum_{j=1}^p \theta_j \phi_j(t) dt + d\xi_t, \quad 0 \leq t \leq n, \quad (6)$$

где $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_p)'$ – вектор неизвестных параметров из некоторого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$, n – натуральное число. Предположим, что $(\phi_j)_{1 \leq j \leq p}$ – система линейно независимых 1-периодических ортонормальных функций из пространства $\mathcal{L}_2[0,1]$; шум $(\xi_t)_{t \geq 0}$ – скалярный негауссовский процесс Орнштейна – Уленбека, т.е.

$$d\xi_t = a\xi_t dt + du_t, \quad (7)$$

где $a \leq 0$ – мешающий параметр, а (u_t) – процесс Леви вида

$$u_t = \varrho_1 w_t + \varrho_2 z_t, \quad (8)$$

$(w_t)_{t \geq 0}$ – стандартное броуновское движение, $(z_t)_{t \geq 0}$ – составной пуассоновский процесс, т.е.

$$z_t = \sum_{j=1}^{N_t} Y_j, \quad (9)$$

$(N_t)_{t \geq 0}$ – однородный пуассоновский процесс с интенсивностью $\lambda > 0$, а $(Y_j)_{j \geq 1}$ – последовательность н.о.р. гауссовских случайных величин с параметрами $(0, 1)$. Параметры a , ϱ_1 , ϱ_2 и λ – неизвестные постоянные.

Заметим, что регрессионная модель (6) – (9) позволяет рассматривать также модели с зависимыми шумами, включающими импульсные возмущения.

Задача – оценить неизвестный вектор параметров $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_p)'$ в модели (6) по наблюдениям $(y_t)_{0 \leq t \leq n}$.

Качество оценки $\tilde{\theta}$ будем измерять квадратическим риском

$$R(\theta, \tilde{\theta}) = \mathbf{E}_\theta \|\theta - \tilde{\theta}\|^2.$$

Пусть $\mathcal{G} = \sigma\{N_t, t \geq 0\}$ обозначает σ -алгебру, порожденную пуассоновским процессом. Заметим, что модель (6) является условно-гауссовской относительно определенной σ -алгебры $\mathcal{G}$. Поэтому можно использовать оценку (5), чтобы получить улучшенную оценку параметра θ . С этой целью представим исходную регрессионную модель с непрерывным временем (6) в виде модели типа (4).

Классической оценкой для неизвестного вектора θ в модели (6) по наблюдениям $(y_t)_{0 \leq t \leq n}$ является оценка по методу наименьших квадратов (МНК) $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_p)'$ с

$$\hat{\theta}_j = \frac{1}{n} \int_0^n \phi_j(t) dy_t, \quad j = \overline{1, p}.$$

Отсюда, принимая во внимание (6), имеем

$$\hat{\theta} = \theta + \varepsilon_n \zeta(n), \quad (10)$$

где $\varepsilon_n = n^{-1/2}$ и $\zeta(n)$ – случайный вектор с координатами

$$\zeta_j(n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \phi_j(t) d\xi_t.$$

Заметим, что вектор $\zeta(n)$ имеет условно-гауссовское распределение с нулевым средним и случайной ковариационной матрицей $V_n(\mathcal{G}) = \text{cov}(\zeta(n), \zeta(n)' | \mathcal{G})$ с элементами $v_{ij}(n) = \mathbf{E}(\zeta_i(n)\zeta_j(n) | \mathcal{G})$.

Таким образом, исходная задача оценивания параметра θ в (6) сводится к задаче оценивания неизвестного параметра θ в условно-гауссовской регрессии (10).

Теорема 3.1. Пусть регрессионная модель определяется уравнениями (6) – (9), $\varrho_1 > 0$. Тогда для всех $n \geq 1$ и $p \geq 2$ оценка для θ

$$\theta^* = \left(1 - \frac{(p-1)\varrho_1^2 \gamma_p}{n \|\hat{\theta}\|} \right) \hat{\theta}$$

доминирует для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ оценку МНК $\hat{\theta}$:

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq - \left[\frac{(p-1)\varrho_1^2 \gamma_p}{n} \right]^2.$$

Для доказательства теоремы достаточно проверить условия (C_1) , (C_2) для случайной матрицы $V_n(\mathcal{G})$ и применить теорему 2.1. Доказательство теоремы 3.1 приводится в приложении.

4. Улучшенное оценивание в авторегрессии

В данном разделе оценка (5) применяется для решения задачи улучшенного оценивания неизвестного среднего многомерного нормального распределения, когда ковариационная матрица неизвестна и зависит от некоторых мешающих параметров.

I. Пусть в модели (4) шум $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_p)'$ описывается гауссовским процессом авторегрессии

$$\xi_k = a\xi_{k-1} + \varepsilon_k, \quad k = \overline{1, p}, \quad (11)$$

где $|a| < 1$, $\mathbf{E}\xi_0 = 0$ и $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p$ – независимые стандартные гауссовские случайные величины. Предположим, что параметр a в уравнении (11) неизвестен и принадлежит сегменту $[-a_0, a_0]$, где a_0 – известное число из интервала $(0, 1)$.

Нетрудно проверить, что ковариационная матрица шума ξ имеет вид

$$D(a) = \frac{1}{1-a^2} \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{p-1} \\ a & 1 & \dots & a^{p-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{p-1} & a^{p-2} & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Далее рассмотрим задачу оценивания вектора параметров θ в модели (4) с шумами (11).

Предложение 4.1. Пусть шум ξ в модели (4) определяется уравнением (11) с $a \in [-a_0, a_0]$. Тогда для всех $p > 1/(1-a_0)^2$ оценка для θ , определяемая равенством

$$\theta^* = \left(1 - \left(p - \frac{1}{(1-a_0)^2} \right) \frac{\gamma_p}{\|Y\|} \right) Y,$$

доминирует для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ оценку максимального правдоподобия, т.е.

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq - \left(p - \frac{1}{(1-a_0)^2} \right)^2 \gamma_p^2.$$

Доказательство. Воспользуемся схемой доказательства теоремы 2.1. Имеем, что $\text{tr } D(a) = p/(1-a^2)$. Оценим сверху максимальное собственное значение матрицы $D(a)$, учитывая, что

$$\lambda_{\max}(D(a)) = \sup_{\|z\|=1} z'D(a)z.$$

Из (12) следует, что

$$\begin{aligned} z'D(a)z &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \langle D(a) \rangle_{ij} z_i z_j = \frac{1}{1-a^2} \left(1 + 2 \sum_{i=1}^{p-1} \sum_{l=1}^{p-i} a^l z_i z_{l+i} \right) = \\ &= \frac{1}{1-a^2} \left(1 + 2 \sum_{l=1}^{p-1} a^l \sum_{i=1}^{p-l} z_i z_{i+l} \right). \end{aligned}$$

Применяя неравенство Коши – Буняковского, получаем

$$\lambda_{\max}(D(a)) \leq \frac{1}{1-a_0^2} \left(1 + 2 \sum_{l=1}^{\infty} a_0^l \right) = \frac{1}{(1-a_0)^2}.$$

Таким образом,

$$\text{tr } D(a) - \lambda_{\max}(D(a)) \geq p - \frac{1}{(1-a_0)^2}.$$

Отсюда, в силу теоремы 2.1 приходим к утверждению предложения 4.1.

II. Рассмотрим модель (4) с шумом, зависящим от нескольких неизвестных мешающих параметров. Пусть в модели (4) шум $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_p)'$ описывается стационарным многомерным гауссовским процессом авторегрессии q -го порядка $AR(q)$

$$\xi_k = a_1 \xi_{k-1} + a_2 \xi_{k-2} + \dots + a_q \xi_{k-q} + \varepsilon_k, \quad k = \overline{1, p}, \quad (13)$$

где $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p$ – независимые стандартные гауссовские случайные величины. Незвестный вектор $a = (a_1, \dots, a_q)'$ принадлежит области устойчивости процесса

$$\mathcal{A} = \{a \in \mathbb{R}^q : \max_{1 \leq i \leq q} \text{Re } \lambda_i(a) < 0\},$$

где $(\lambda_i(a))_{1 \leq i \leq q}$ – собственные значения матрицы

$$A = A(a) = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_q \\ & I_{q-1} & 0 \end{pmatrix};$$

I_q – единичная матрица порядка q .

Как можно проверить, ковариационная матрица вектора ξ в данном случае имеет вид

$$D = \begin{pmatrix} \langle F \rangle_{11} & \langle AF \rangle_{11} & \dots & \langle A^{p-1}F \rangle_{11} \\ \langle AF \rangle_{11} & \langle F \rangle_{11} & \dots & \langle A^{p-2}F \rangle_{11} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle A^{p-1}F \rangle_{11} & \langle A^{p-2}F \rangle_{11} & \dots & \langle F \rangle_{11} \end{pmatrix}; \quad (14)$$

F – матрица, удовлетворяющая уравнению

$$F - AFA' = B,$$

$B = \|\delta_{1i}\delta_{1j}\|$ – матрица размера $q \times q$, δ_{ij} – символ Кронекера.

Обозначим $p_0 = 1 + \sup_{a \in K} (2c_* \|F\|) / ((1-\rho) \langle F \rangle_{11})$, где K – некоторый компакт из области устойчивости $\mathcal{A}$, $c_* > 0$ и $0 < \rho < 1$ – постоянные.

Предложение 4.2. Пусть вектор шумов ξ в (4) определяется (13). Тогда для всех $p > p_0$ оценка для θ , определяемая формулой

$$\theta^* = \left(1 - \left((p-1) \langle F \rangle_{11} - \frac{2c_*\rho \|F\|}{1-\rho} \right) \frac{\gamma_p}{\|Y\|} \right) Y,$$

доминирует для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ оценку максимального правдоподобия, т.е.

$$\sup_{\theta \in \Theta} \Delta(\theta) \leq - \left((p-1) \langle F \rangle_{11} - \frac{2c_*\rho \|F\|}{1-\rho} \right)^2 \gamma_p^2.$$

Доказательство. Используем схему доказательства теоремы 2.1. Имеем, что $\text{tr } D = p \langle F \rangle_{11}$. Оценим сверху максимальное собственное значение матрицы D , воспользовавшись тем, что $\lambda_{\max}(D) = \sup_{\|z\|=1} z'Dz$. Учитывая (14), находим

$$\begin{aligned} z'Dz &= \left| \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \langle D \rangle_{ij} z_i z_j \right| = \left| \langle F \rangle_{11} + 2 \sum_{i=1}^{p-1} \sum_{l=1}^{p-i} \langle A^l F \rangle_{11} z_i z_{l+i} \right| \leq \\ &\leq \langle F \rangle_{11} + 2 \left| \sum_{l=1}^{p-1} \langle A^l F \rangle_{11} \sum_{i=1}^{p-l} z_i z_{l+i} \right|. \end{aligned}$$

Применяя неравенство Коши – Буняковского и матричные неравенства $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ и $\|A^l\| \leq c_* \rho^l$, получаем

$$\sup_{\|z\|=1} z'Rz \leq \langle F \rangle_{11} + \frac{2c_*\rho \|F\|}{1-\rho}.$$

Таким образом,

$$\text{tr } D - \lambda_{\max}(D) \geq (p-1) \langle F \rangle_{11} - \frac{2c_*\rho \|F\|}{1-\rho}.$$

Принимая во внимание теорему 2.1, приходим к утверждению предложения 4.2.

5. Приложение

5.1. Доказательство леммы 2.2

Доказательство. Исходя из (4), имеем

$$J = \mathbf{E}_0 \frac{1}{\|Y\|} = \mathbf{E}_0 \frac{1}{\|\theta + \xi\|} \geq \mathbf{E}_0 \frac{1}{d + \|\xi\|}.$$

Перейдем к повторному условному математическому ожиданию. Так как при фиксированной σ -алгебре $\mathcal{G}$ случайный вектор ξ распределен нормально с нулевым средним, то

$$J \geq \mathbf{E}_0 \frac{1}{(2\pi)^{p/2} \sqrt{\det D(\mathcal{G})}} \int_{\mathbb{R}^p} \frac{\exp\{-x'D(\mathcal{G})^{-1}x/2\}}{d + \|x\|} dx.$$

Обозначая $u = D(\mathcal{G})^{-1/2}x$ и применяя оценку $u'D(\mathcal{G})u \leq \lambda_{\max}(D(\mathcal{G}))\|u\|^2$, находим

$$J \geq \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} \mathbf{E}_0 \int_{\mathbb{R}^p} \frac{\exp\{-\|u\|^2/2\}}{d + \lambda_{\max}^{1/2}(D(\mathcal{G}))\|u\|} du.$$

Далее, переходя к сферическим координатам, имеем

$$J \geq \frac{2}{2^{p/2}\Gamma(p/2)} \mathbf{E}_0 \int_0^\infty \frac{r^{p-1}e^{-r^2/2}}{d + \lambda_{\max}^{1/2}(D(\mathcal{G}))r} dr.$$

Отсюда, при использовании неравенства Йенсена, Коши – Буняковского и условия (C_2) следует, что

$$J \geq \frac{\kappa}{2^{p/2-1}\Gamma(p/2)d} \int_0^\infty \frac{r^{p-1}e^{-r^2/2}}{\kappa + r} dr.$$

Вычислим интеграл, стоящий в правой части неравенства. Разделив r^{p-1} на $\kappa + r$, получим

$$\int_0^\infty \frac{r^{p-1}e^{-r^2/2}}{\kappa + r} dr = \sum_{j=0}^{p-2} 2^{\frac{j-1}{2}} (-\kappa)^{p-2-j} \Gamma\left(\frac{j+1}{2}\right) + (-\kappa)^{p-1} I(\kappa),$$

где функция $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{e^{-r^2/2}}{\alpha + r} dr$. Лемма 2.2 доказана.

5.2. Проверка условий (C_1) и (C_2) для матрицы $V_n(\mathcal{G})$

Элементы матрицы $V_n(\mathcal{G})$ могут быть переписаны как [8]

$$\begin{aligned} v_{ij}(n) &= \frac{\theta_1^2}{n} \int_0^n \phi_i(t)\phi_j(t)dt + \frac{\theta_1^2}{2n} \int_0^n (\phi_i(t)\varepsilon_{\phi_j}(t) + \phi_j(t)\varepsilon_{\phi_i}(t))dt + \frac{\theta_2^2}{n} \sum_{l \geq 1} \phi_i(T_l)\phi_j(T_l)\chi_{(T_l \leq n)} \\ &+ \frac{\theta_2^2}{n} \sum_{l \geq 1} \int_0^n (\phi_i(t)L_{\phi_j}(t-T_l, T_l) + \phi_j(t)L_{\phi_i}(t-T_l, T_l))\chi_{(T_l \leq n)} dt, \end{aligned} \quad (15)$$

где $\varepsilon_f(t) = a \int_0^t e^{a(t-v)} f(v)(1 + e^{2av}) dv$,

$$L_f(x, z) = ae^{ax} \left(f(z) + a \int_0^x e^{av} f(v+z) dv \right)$$

и $(T_l)_{l \geq 1}$ – моменты скачков пуассоновского процесса $(N_t)_{t \geq 0}$, т.е.

$$T_l = \inf\{t \geq 0: N_t = l\}.$$

Лемма 5.1. Пусть $(\xi_t)_{t \geq 0}$ определяется уравнением (7) с $a \leq 0$. Тогда минимальное собственное значение матрицы $V_n(\mathcal{G})$ с элементами, определенными (15), удовлетворяет следующему неравенству:

$$\inf_{n \geq 1} \lambda_{\min}(V_n(\mathcal{G})) \geq \varrho_1^2.$$

Доказательство. Согласно (15), матрицу $V_n(\mathcal{G})$ можем представить в виде

$$V_n(\mathcal{G}) = \varrho_1^2 I_p + F_n + B_n(\mathcal{G}),$$

где F_n – неслучайная матрица с элементами

$$f_{ij}(n) = \frac{\varrho_1^2}{2n} \int_0^n (\phi_i(t) \varepsilon_{\phi_j}(t) + \phi_j(t) \varepsilon_{\phi_i}(t)) dt,$$

а $B_n(\mathcal{G})$ – случайная матрица с элементами

$$b_{ij}(n) = \frac{\varrho_2^2}{n} \sum_{l \geq 1} \left[\phi_i(T_l) \phi_j(T_l) \chi_{(T_l \leq n)} + \int_0^n (\phi_i(t) L_{\phi_j}(t - T_l, T_l) + \phi_j(t) L_{\phi_i}(t - T_l, T_l)) \chi_{(T_l \leq t)} dt \right].$$

Отсюда находим

$$z' V_n(\mathcal{G}) z = \varrho_1^2 z' z + z' F_n z + z' B_n(\mathcal{G}) z \geq \varrho_1^2 \|z\|^2$$

для всех $n \geq 1$. Поэтому

$$\lambda_{\min}(V_n(\mathcal{G})) \geq \varrho_1^2.$$

Лемма 5.1 доказана.

Обозначим $\varrho^* = \varrho_1^2 + \lambda \varrho_2^2$ и $M = 1 + 2K^2$, где $\max_{0 \leq t \leq n} |\phi_j(t)| \leq K$, $j = \overline{1, p}$.

Лемма 5.2. Пусть $(\xi_t)_{t \geq 0}$ определяется уравнением (7) с $a \leq 0$. Тогда максимальное собственное значение матрицы $V_n(\mathcal{G})$ с элементами, определенными (15), удовлетворяет для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ следующему неравенству:

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbf{E}_\theta \lambda_{\max}(V_n(\mathcal{G})) \leq Mp \varrho^*.$$

Доказательство. Имеем

$$\mathbf{E}_\theta \lambda_{\max}(V_n(\mathcal{G})) \leq \mathbf{E}_\theta \text{tr}(V_n(\mathcal{G})) = \sum_{j=1}^p \mathbf{E}_\theta \zeta_j^2(n) = \frac{\varrho^*}{n} \sum_{j=1}^p \tau_j(n),$$

где $\tau_j(n) = \int_0^n \phi_j^2(t) dt + a \int_0^n \int_0^t e^{a(t-u)} \phi_j(u) (1 + e^{2au}) du dt$. Поскольку $(\phi_j)_{1 \leq j \leq p}$ –

1-периодические ортонормальные функции, то $\int_0^n \phi_j^2(t) dt = n$ и, ввиду ограничен-

ности этих функций, для любого $a \leq 0$ находим

$$a \int_0^n \phi_j(t) \int_0^t e^{a(t-u)} \phi_j(u) (1 + e^{2au}) du dt \leq 2K^2 |a| \int_0^n \int_0^t e^{a(t-u)} du dt \leq 2K^2 n.$$

Таким образом, для всех $n \geq 1$ и $\theta \in \Theta$

$$\mathbf{E}_\theta \lambda_{\max}(V_n(\mathcal{G})) \leq Mp \varrho^*.$$

Лемма 5.2 доказана.

В леммах 5.1 и 5.2 показано, что матрица $V_n(\mathcal{G})$ является положительно определенной и для любого компакта $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ удовлетворяет условиям (C_1) , (C_2) с $\lambda_* = \varrho_1^2$ и $a^* = Mp \varrho^*$. В силу теоремы 2.1 получаем утверждение теоремы 3.1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berger J.O., Haff L.R. A class of minimax estimators of a normal mean vector for arbitrary quadratic loss and unknown covariance matrix // Statist. Decisions. 1983. No. 1. P. 105–129.
2. Efron B., Morris C. Families of minimax estimators of the mean of a multivariate normal distribution // Ann. Statist. 1976. No. 4. P. 11–21.
3. Fourdrinier D. Statistique inférentielle // D. Fourdrinier. Dunod. 2002. P. 336.
4. Fourdrinier D., Pergamenschchikov S. Improved selection model method for the regression with dependent noise // Ann. Inst. Statist. Math. 2007. V. 59 (3). P. 435–464.
5. Fourdrinier D., Strawderman W.E., William E. A unified and generalized set of shrinkage bounds on minimax Stein estimates // J. Multivariate Anal. 2008. V. 99. P. 2221–2233.
6. Gleser L.J. Minimax estimators of a normal mean vector for arbitrary quadratic loss and unknown covariance matrix // Ann. Statist. 1986. V. 14. No. 1625–1633.
7. James W., Stein C. Estimation with quadratic loss // Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematics Statistics and Probability. V. 1. Berkeley: University of California Press, 1961. P. 361–380.
8. Konev V., Pergamenschchikov S. Efficient robust nonparametric estimation in a semimartingale regression model. URL: <http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00526915/fr/> (2010).
9. Stein C. Estimation of the mean of a multivariate normal distribution // Ann. Statist. 1981. V. 9(6). P. 1135–1151.

Статья поступила 19.07.2011 г.

Pchelintsev E.A. THE JAMES–STEIN PROCEDURE FOR A CONDITIONALLY GAUSSIAN REGRESSION. The paper considers the problem of estimating a p -dimensional ($p \geq 2$) mean vector of a multivariate conditionally normal distribution under quadratic loss. The problem of this type arises when estimating the parameters in a continuous time regression model with a non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck process. We propose a modification of the James–Stein procedure of the form $\theta^*(Y) = (1 - c/\|Y\|) Y$, where Y is an observation and $c > 0$ is a special constant. This estimate allows one to derive an explicit upper bound for the quadratic risk and has a significantly smaller risk than the usual maximum likelihood estimator for the dimensions $p \geq 2$. This procedure is applied to the problem of parametric estimation in a continuous time conditionally Gaussian regression model and to that of estimating the mean vector of a multivariate normal distribution when the covariance matrix is unknown and depends on some nuisance parameters.

Keywords: conditionally Gaussian regression model; improved estimation; James – Stein procedure; non-Gaussian Ornstein – Uhlenbeck process.

PCHELINZEV Evgenii Anatol'evich (Tomsk State University,
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, Université de Rouen (France))
E-mail: evgen-pch@yandex.ru