
УДК 582.998(571)

***Jurinea mongolica* Maxim. (Asteraceae) – новый вид для флоры России**

© В.И. Курбатский

Томский государственный университет, Томск, Россия, celloc@sibmail.com

Впервые для флоры России приводится *Jurinea mongolica* Maxim. (Asteraceae), собранный на юге Республика Тыва (Тува). По литературным сведениям вид распространён на территории Западной Монголии и прилегающей северо-западной части Китая.

Ключевые слова: *Jurinea mongolica*, новый вид, флора, Россия.

При просмотре материалов по роду *Jurinea* Cass. в Тувино-Монгольском отделе Гербария им. П.Н. Крылова в пачке с неопределёнными растениями наше внимание привлёк весьма своеобразный по внешнему габитусу экземпляр растения, собранный на территории Республики Тыва (Тува) ещё в 1971 г. Данное растение было определено нами как *Jurinea mongolica* Maxim. Ранее на территории России этот вид не отмечался.

J. mongolica весьма самобытный в отношении морфологического строения вид. С.В. Смирновым (2001) даже было намечено выделение вида в самостоятельную секцию («sect. *Mongolicae* S.V. Smirnov»). По литературным данным (Грубов, 1982; Meng..., 2011) указанный вид встречается на территории Западной Монголии и прилегающей северо-западной части Китая. Найденный образец представлен единственным растением, но все основные диагностические признаки вида выражены у него довольно чётко (рис. 1 / Figure 1). Наиболее характерными признаками являются: цельные или перистолопастные прикорневые листья с густым белым войлочным опушением, крупные корзинки (20–30 мм в диам.), голые гладкие семянки с неоппадающим перистым хохолком.

Найденный в Гербарии им. П.Н. Крылова образец документирует единственное пока местонахождение вида на территории России в Республике Тыва: «Тувинская АССР, Тес-Хемский р-н, окрестности с. Шара-Сур, по дороге в сторону р. Нарын, опустыненная степь. 20.7.1971. Ю.П. Суров, С.Н. Выдрина, А.С. Ревушкин». Оно находится в приграничной с Монголией части республики, которую можно отнести к ботанико-географическому району «Котловина озёр», выделенному В.И. Грубовым (1982) в числе других для территории Монголии. Ближайшее местонахождение вида в Монголии отмечено в районе оз. Хара-Ус-Нур (Грубов, 1982), также входящему в Котловину озёр. Согласно В.И. Грубову (1982), вид на территории Монголии встречается также в Долине озёр, в западной части Восточного Гоби и в Алтайской Гоби.



Рис. 1. *Jurinea mongolica* Maxim. с территории Республики Тыва

Figure 1. *Jurinea mongolica* Maxim. from the territory of Tyva Republic

ЛИТЕРАТУРА

- Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии (с атласом). Л.: Наука, 1982. 442 с.
- Смирнов С.В. Триба *Cardueae* Cass. (Asteraceae) на Алтае: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Барнаул, 2001. 16 с.
- Meng J.L.J. *Jurinea* Cass. // Flora of China. Beijing: Science Press, 2011. Vol. 20–21. P. 43–44.

Поступила 20.05.2014

***Jurinea mongolica* Maxim. (Asteraceae), a new species for the flora of Russia**

V.I. Kurbatskiy

Tomsk State University, Tomsk, Russia, celloc@sibmail.com

Abstract

Jurinea mongolica Maxim. (Asteraceae) is recorded for the first time for flora of Russia. This species was collected on the Republic of Tyva territory: ‘Tuva ASSR, Tes-Khem district, a neighborhood of v. Bowl Sur, on the road to side of the river. Naryn, desert steppes. 20.07.1971. Y.P. Surov, S.N. Vydrina, A.S. Revushkin’. The main range of *J. mongolica* occupies western Mongolia and adjacent north-western China.

Key words: *Jurinea mongolica*, flora, Russia.

REFERENCES

- Grubov V.I. 1982. Opredelitel sosudistyykh rasteniy Mongolii (s atlasom) [Key for vascular plants of Mongolia (with atlas)]. Leningrad: Nauka. 442 p. [in Russian].
- Meng J.L.J. 2011. *Jurinea* Cass. In: Flora of China. Beijng: Science Press. 20–21: 43–44.
- Smirnov S.V. 2001. Triba *Cardueae* Cass. (Asteraceae) na Altae [Tribus *Cardueae* Cass. (Asteraceae) in the Altai]. Autoabstract of the dissertation. Barnaul. 16 p. [in Russian].

Recieved May, 20.2014