

УДК 582.662

Валидизация названий внутривидовых таксонов *Poa* L. (Роасеае), описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири

М.В. Олонова*, И.И. Гуреева

Томский государственный университет, Томск, Россия

*Автор для переписки: olonova@list.ru

Аннотация. Валидизированы названия 7 разновидностей 5 видов рода *Poa* L., описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири: *P. dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd., *P. glauca* Vahl var. *gracilis* Reverd., *P. nemoralis* L. var. *tenuifolia* Reverd., *P. pratensis* var. *caespitosa* Reverd., *P. pratensis* L. var. *lilacina* Reverd., *P. pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd., *P. stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd.

Ключевые слова: разновидности, валидизация, *Poa* L. Роасеае

Финансовая поддержка: Исследование выполнено при поддержке Программы развития Томского государственного университета (Приоритет-2030).

Обрабатывая злаки для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964), В.В. Ревердатто привёл 8 новых разновидностей 5 видов рода *Poa* L.: *Poa altaica* Trin. var. *angustifolia* Reverd., *P. dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd., *P. glauca* Vahl var. *gracilis* Reverd., *P. nemoralis* L. var. *tenuifolia* Reverd., *P. pratensis* var. *caespitosa* Reverd., *P. pratensis* L. var. *lilacina* Reverd., *P. pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd., *P. stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd. Все разновидности опубликованы без соблюдения правил, необходимых для действительного обнародования названий: с 1 января 1935 г. до 31 декабря 2011 г. название должно было сопровождаться латинским диагнозом (Turland et al., 2018: Art. 39.1), с 1 января 1958 г. – иметь ясное указание типа (Turland et al., 2018: Art. 40.1). У рассматриваемых разновидностей имеется лишь краткое описание в определительных ключах на русском языке без указания типа. Поскольку названия разновидностей не являются действительно обнародованными, требуется их валидизация.

Мы валидируем названия 7 разновидностей, приводя описание на английском языке, что возможно с 1 января 2012 г., указав голотипы и место их хранения (Turland et al., 2018: Art. 39.2, 40.1, 40.7), а также цитируем другие типовые образцы, для чего использован оригинальный материал с пометками В.В. Ревердатто. В качестве диагноза приводим переведённые на английский язык краткие описания, данные

В.В. Ревердатто в определительных ключах в обработке рода *Poa* во «Флоре Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Авторство названий мы оставляем за В.В. Ревердатто, которому оно было приписано в этой публикации (Turland et al., 2018: Art. 46.2).

Написания фамилий авторов таксонов скорректированы по «IPNI. International Plant Name Index» (IPNI, 2023). Таксоны перечислены в алфавитном порядке названий видов и разновидностей.

***Poa dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd., var. nova.**

– *Poa dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd. 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 84, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Low plant, 5–15 cm tall, with very narrow and poor panicle, with few spikelets, placed one by one on branch, and sometimes directly on stem.

Holotype [Republic of Khakassia]: Yenisei province, Abakan foreign council, between the Kobelkovo Lake and Bija River, steppe. 10 VIII 1909. V. Titov (TK: TK-004697).

Paratype [Republic of Khakassia]: Yenisei province, Abakan foreign council, vicinity of village Solyanoozernaya, steppe along the slope of mountain Sarat. 19 VIII 1910. V. Titov (TK: TK-004698).

Низкое растение, 5–15 см, с очень узкой и бедной метелкой, с немногочисленными колосками, сидящими по одному на веточке, а иногда и непосредственно на стебле.

Голотип [Республика Хакасия]: Енисейская губерния, Абаканская инородная управа. Между оз. Кобельковым и р. Биджей. Степь. 10 VIII 1909. В. Титов (TK: TK-004697).

Паратип [Республика Хакасия]: Енисейская губерния, Абаканская инородная управа, окр. д. Соляноозерной, степь по склону г. Сарат. 19 VIII 1910. В. Титов (TK: TK-004698).

Название было опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 2 образца, представляющих рассматриваемую разновидность. Они смонтированы на одном листе, каждый образец имеет определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «*Poa dahurica* Trin. var. *paupera* m. Determ. V. Reverdatto». Валидизируя здесь название *Poa dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, второй, относящийся к другому сбору, – как паратип.

***Poa glauca* Vahl var. *gracilis* Reverd., var. nova.**

– *Poa glauca* var. *gracilis* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 80, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: The plant about 35 cm high, does not form dense tufts; all leaves narrow, folded; upper half of stem leafless, spikelets up to 3 mm long.

Holotype: Krasnoyarsk Territory, Evenk National District. River basin Kananda (right tributary of the Nizhnyaya Tunguska River), about N 64°20', E 74° [104°19'34"]. Bearberry larch forest above the river Padushka. 26–27 VII 1935. L. Shumilova, L. Obolentsev (TK: TK-004699; isotype – TK-004700).

Растение около 35 см. выс., не образует плотных дерновинок; все листья узкие, свёрнутые; верхняя половина стебля безлистная, колоски до 3 мм дл.

Г о л о т и п : Красноярский край, Эвенкийский национальный округ, бассейн р. Кананды (правый приток р. Нижней Тунгуски), около 64°20' с.ш., и 74° [104°19'34"] в.д., толокнянковый листвяг над речкой Падушкой, 26–27 VII 1935, Л. Шумилова, Л. Оболенцев (ТК: ТК-004699; изотип – ТК-004700).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 2 образца, представляющих рассматриваемую разновидность, каждый образец имеет определение автора таксона В.В. Ревердатто: «*Poa glauca* var. *gracilis* m.». Валидизируя здесь *Poa glauca* var. *gracilis* Reverd., один образец мы цитируем как голотип, второй, относящийся к этому же сбору, – как изотип.

***Poa nemoralis* L. var. *tenuifolia* Reverd., var. nova.**

– *Poa nemoralis* L. *tenuifolia* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 81, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Mountain-forest plants up to 45 cm tall, with mostly folded or rolled leaves, compressed panicle, and lilac-colored, (1)2–3-floret spikelets up to 4 mm long.

Holotype [Republic of Khakassia]: Khakass county, valley of the Maly Azas River (a tributary of the Ana River), vicinity of the Cherkasov mine, 9 VI 1927, В. Ревердатто (ТК: ТК-004701).

Para types [Krasnoyarsk Territory]: Kansky county, Abansky district, the bank of Begim river near Baikon village, N 56° and E 66° [96°19'34"], spruce forest, 14 VII 1930, К.К. Полуйактов (ТК: ТК-004702); Krasnoyarsk Territory, Usinskiy district, Western Sayan, vicinity of village Verkhne-Usinskoye, floodplain of the Us River, gravel, 21 VI 1949, М.А. Алbitskaya, В.М. Nesterova (ТК: ТК-004709).

Горно-лесные растения до 45 см выс., с большей частью сложенными или свернутыми листьями, сжатой метёлкой и лилово покрашенными, (1)2–3-цветковыми колосками до 4 мм дл.

Г о л о т и п [Республика Хакасия]: Хакасский округ, долина реки Малый Азас (приток р. Аны), окрестности прииска Черкасова, 9 VI 1927, В. Ревердатто (ТК: ТК-004701).

П а р а т и п ы [Красноярский край]: Канский окр., Абанский район, по бер. речки Бегим у деревни Байкон, 56° с.ш. и 66° [96°19'34"] в.д., еловый лес, 14 VII 1930, К.К. Полуяхтов (ТК: ТК-004702); Красноярский край, Усинский район, Западные Саяны, окр. с. Верхне-Усинского, пойма р. Ус, галечник, 21 VI 1949, М.А. Альбицкая, В.М. Нестерова (ТК: ТК-004709).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе для определения разновидностей *Poa nemoralis*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 3 образца, представляющих рассматриваемую разновидность. Все образцы имеют определительные этикетки автора разновидности В.В. Ревердатто: «*Poa nemoralis* L. var. *tenuifolia* m.». Валидизируя здесь название *Poa nemoralis* L. *tenuifolia* Reverd. образец ТК-004701, наиболее

подходящий по признакам к описанной разновидности мы цитируем как голотип, образцы ТК-004702 и ТК-004709, относящиеся к другим сборам, – как паратипы.

***Poa pratensis* L. var. *caespitosa* Reverd., var. nova.**

– *Poa pratensis* var. *caespitosa* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 74, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Plants 35–70 cm tall, stems numerous, formed more or less dense tufts, basal leaves abundant, flat, up to 3 mm broad, upper leaves 4–10 cm long, sometimes reaching panicles. Panicle multi-spiked, elongated, up to 13 cm long, mostly green, often more or less compressed, and then drooping at the top.

Holotype: Krasnoyarsk Territory, Evenk National district, Podkamennaya Tunguska basin, meteorite farm, around the hut, 3 VII 1932, L.V. Shumilova (TK: TK-004713).

Paratypes: Krasnoyarsk Territory, Turukhansk district, shore of Bolshoye Makovskoye lake, 29 VII 1936, E.I. Bakanach (TK: TK-004714); [Krasnoyarsk Territory]: Yenisei River, N 69°51', between Tobolovka and Sukhaya Dudinka, willow thickets in a vast lowland, 8 VIII 1914, V. Reverdatto (TK: TK-004715); [Krasnoyarsk Territory]: Between Tobolovka and Sukhaya Dudinka, *Salix* thickets, 7 VIII 1914, N.I. Kuznetsov and V. Reverdatto, No 3285 (TK: TK-004716).

Растения 35–70 см выс., стебли многочисленные, собраны в более или менее плотные дерновинки, прикорневые листья обильные, плоские, до 3 мм шир., верхние – 4–10 см дл., иногда достигающие метёлки. Метёлка многоколосковая, удлинённая, до 13 см дл., большей частью зелёная, нередко более или менее сжатая и тогда на верхушке поникающая.

Г о л о т и п : Красноярский край, Эвенкийский национальный округ, бассейн Подкаменной Тунгуски, Метеоритная заимка, вокруг избушки, 3 VII 1932, Л.В. Шумилова (TK: TK-004713).

П а р а т и п ы : Красноярский край, Туруханский район, берег озера Большое Маковское, 29 VII 1936, Е.И. Баканач (TK: TK-004714); [Красноярский край]: Р. Енисей, 69°51' с.ш., между Тоболовкой и Сухой Дудинкой, тальниковые заросли в обширной низине, 8 VIII 1914, В. Ревердатто (TK: TK-004715); [Красноярский край]: Гербарий Переселенческого управления. Экспедиция в Туруханский край, 1914 г., между Тоболовкой и Сухой Дудинкой, заросли *Salix*, 7 VIII 1914, Н.И. Кузнецов и В. Ревердатто, № 3285 (TK: TK-004716).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе для определения разновидностей *Poa pratensis*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 4 образца, представляющих рассматриваемую разновидность. Все образцы имеют определительные этикетки автора разновидности В.В. Ревердатто: «*Poa pratensis* L. var. *caespitosa* m.». Валидизируя здесь название *Poa pratensis* L. var. *caespitosa* Reverd., образец ТК-004713, наиболее подходящий по признакам к описанной разновидности, мы цитируем как голотип, остальные образцы, относящиеся к другим сборам, являются паратипами.

***Poa pratensis* L. var. *lilacina* Reverd., var. nova.**

– *Poa pratensis* var. *lilacina* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 74, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Plants 20–40 cm tall, stems mostly solitary, usually with short (2–4 cm long) flag leaves. Basal leaves mostly absent or very few. Panicle small, compressed, up to 10 cm long with purple-colored mostly 3-floret spikelets.

Holotype [Krasnoyarsk Territory]: Vicinity of Krasnoyarsk, steppe slope along the 2nd Bugach river, 27 VI 1936, V.I. Vereshchagin (TK: TK-004703).

Paratypes [Republic of Khakasia]: Kuznetsk Alatau, Ust-Abakansky district, vicinity of the farm Uleny N $54^{\circ}12'$, E $89^{\circ}3'$, valley of Ulen River, steppe meadow, 10 VII 1936, K.A. Sobolevskaya, Z.G. Shunkova, L.I. Zaitseva (TK: TK-004704); [Krasnoyarsk Territory]: Evenki National county, basin of Podkamennaya Tunguska river, Baykitsky reindeer sovkhos, N $61^{\circ}40'$, E $95^{\circ}41'$, degraded peat bog, 20 VII 1938, M.F. Zharkova (TK: TK-004705); [Republic of Khakasia]: Khakass region, Charkovsky district, valley of Abacan River, floodplain of Tasheba River, near the ulus Tuguzhekovo, N $53^{\circ}2'$, E $60^{\circ}3'$ [$90^{\circ}39'34''$], 2 VII 1933, V.V. Reverdatto, V. Golubintseva, T. and Z. Kurakins (TK: TK-004706, TK-004707); [Republic of Khakasia]: Minusinsk district, Koibal steppe, between the villages Oznachennaya and Kalskiy, irrigated meadows (mochagi), 13 VI 1927, V.V. Reverdatto (TK: TK-004708); [Republic of Khakasia]: Khakas region, crossing Erbinsky, N $53^{\circ}8'$, E $59^{\circ}6'$ [$90^{\circ}09'34''$], steppe meadows. Goszemtrest Expedition, 11 VII 1932, V.V. Reverdatto, V.V. Tarchevsky and Z. Kurakina (TK: TK-004710); [Republic of Khakasia]: Abakanskaya expedition of prof. Reverdatto V.V. 1927. Minusinsk county, vicinity of the village, irrigated meadows (mochagi), 24 VI 1927, V.V. Reverdatto (TK: TK-004711).

Растения 20–40 см выс., стебли большей частью одиночные, обычно с короткими (2–4 см дл.) верхними стеблевыми листьями. Прикорневые листья в основном отсутствуют или очень немногочисленные. Метёлка сжатая, до 10 см дл. с фиолетово-покращенными, обычно трёхцветковыми колосками.

Голотип [Красноярский край]: Окрестности г. Красноярска, степной склон по реке 2-му Бугачу, 27 VI 1936, В.И. Верещагин (TK: TK-004703).

Паратипы [Республика Хакасия]: Кузнецкий Алатау, Усть-Абаканский р-н, окр. хутора Уленского, $54^{\circ}12'$ с.ш. $89^{\circ}3'$ в.д., долина р. Улень, остепненный луг, 10 VII 1936, К.А. Соболевская, З.Г. Шункова, Л.И. Зайцева (TK: TK-004704); [Красноярский край]: Эвенкийский нац. окр., басс. р. Подкаменной Тунгуски, Байкитский оленесовхоз, $61^{\circ}40'$ с.ш. и $95^{\circ}41'$ в.д., торфяное деградированное болото, 20 VII 1938, М.Ф. Жаркова (TK: TK-004705); [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Reverdatto В.В. Хакасская обл., Чарковский р-н, долина р. Абакана, пойма р. Ташебы, близ улуса Тугужеково, $53^{\circ}2'$ с.ш. и $60^{\circ}3'$ [$90^{\circ}39'34''$] в.д., 2 VII 1933. В.В. Reverdatto, В. Голубинцева, Т. и З. Куракины (TK: TK-004706, TK-004707); [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Reverdatto В.В., 1927 г. Койбальская степь, между д. Означенной и пос. Кальским, поливные луга (мочаги), 3–13 VI 1927, В.В. Reverdatto (TK: TK-004708); [Республика Хакасия]: Хакасская обл., окр. разъезда Ербинского, $53^{\circ}8'$ с.ш. и $59^{\circ}6'$ [$90^{\circ}09'34''$] в.д. Степные луга. Экспедиция Госземтреста, 11 VII 1932, В.В. Reverdatto, В.В. Тарчевский и З. Куракина (TK: TK-004710); [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Reverdatto В.В. 1927 г.

Минусинский окр., окр. с. Бейского, поливаемые луга (мочаги), 24 VI 1927, В.В. Ревердатто (ТК: ТК-004711).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Роасеае для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе для определения разновидностей *Poa pratensis*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 8 образцов, представляющих рассматриваемую разновидность. Все образцы имеют определительную этикетку автора разновидности В.В. Ревердатто: «*Poa pratensis* L. var. *lilacina* m.» или «*Poa pratensis* L. var. *lilacina* Reverd.». Валидизируя здесь название *Poa pratensis* L. var. *lilacina* Reverd., образец ТК-004703, наиболее подходящий по признакам к описанной разновидности, мы цитируем как голотип, остальные образцы являются паратипами.

***Poa pratensis* L. var. *pseudovulgaris* Reverd., var. nova.**

– *Poa pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 74, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Plants 35–70 cm tall, stems usually solitary or 1–3 in number, with upper leaves 4–10 cm long, sometimes reaching panicles; basal leaves narrow, flat, sometimes folded lengthwise, reaching $\frac{3}{4}$ of stem length. Panicle elongated, up to 13 cm long, mostly with green spikelets, often more or less compressed, and then drooping at top.

Holotype: Krasnoyarsk Territory, Turukhanskiy district, the Taz River at the mouth of a tributary of the Matylky River, N 62°30', E 56° [86°19'34"], at buildings on the site of a reduced forest, 7–10 VII 1936, M.F. Zharkova (ТК: ТК-004717).

Paratypes [Krasnoyarsk Territory]: Krasnoyarsk county, vicinity of Kazachinsky experimental field, 25 VIII 1930, Muravlyanskaya and Kozhevnikova (ТК: ТК-004718); [Republic of Khakasia]: Abakan expedition by prof. Reverdatto V.V., 1927. Minusinsky district, Koibal steppe, between settlements Letnik and Novokurskaya, 18 VI 1927, [V.V. Reverdatto] (ТК: ТК-004719); Krasnoyarsk Territory, Turukhansky district, the Taz River from the mouth of the Ratta River to the trading post Tolka, N 62½°, E 54½° [84°49'34"], overgrowing shallows, 4–10 VIII 1936, M.F. Zharkova (ТК: ТК-004720); [Republic of Khakasia]: Western Sayan, the Abakan River system, valley of river Karatosh [Kharatas], a tributary of the Ana River, subalpine region, pebble banks of the river, 19 VII 1928, V. Reverdatto (ТК: ТК-004721); Krasnoyarsk Territory, Evenk national county, settlement Yartsevo, floodplain meadows of the Yenisei River, 7 VII 1936, L.P. Levchuk (ТК: ТК-004722); Красноярский край, Эвенкийский национальный округ, on the eastern slope to the lake Opeka (basin of the Nizhnyaya Tunguska River – N 66°, E 62° [92°19'34"]), 9 VII 1935, A.Z. Lomakin (ТК: ТК-004723).

Растения 35–70 см выс., стебли обычно одиночные или в количестве 1–3, с верхними листьями 4–10 см дл., иногда достигающими метёлки; прикорневые листья узкие, плоские, иногда вдоль сложенные, достигающие $\frac{3}{4}$ длины стебля. Метёлка удлинённая, до 13 см дл., большей частью с зелёными колосками, нередко более или менее сжатая и тогда на верхушке поникающая.

Г о л о т и п : Красноярский край, Туруханский район, река Таз в устье притока реки Матылькы, 62°30' с.ш., 56° [86°19'34"] в.д., у построек на месте сведённого леса, 7–10 VII 1936, М.Ф. Жаркова (ТК: ТК-004717).

Паратипы [Красноярский край]: Красноярский округ, окр. Казачинского опытного поля, 25 VIII 1930, Муравлянская и Кожевникова (ТК: ТК-004718); [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция Ревердатто В.В. 1927 г. Минусинский округ, Койбальская степь, между ул. Летник и д. Ново-Курской, 18 VI 1927, [В.В. Ревердатто] (ТК: ТК-004719); Красноярский край, Туруханский р-н, река Таз от устья р. Ратты до фактории Толька, $62\frac{1}{2}^{\circ}$ с.ш. и $54\frac{1}{2}^{\circ}$ [$84^{\circ}49'34''$] в.д., зарастающие отмели, 4–10 VIII 1936, М.Ф. Жаркова (ТК: ТК-004720); [Республика Хакасия]: Западные Саяны, система р. Абакана, долина рч. Каратош [Харатас] (приток р. Аны), субальпийская область, галечниковые берега речки, 19 VII 1928, В. Ревердатто (ТК: ТК-004721); Красноярский край, Туруханский район, ст. Ярцево, пойменные луга р. Енисея, 7 VII 1936, Л.П. Левчук (ТК: ТК-004722); Красноярский край, Эвенкийский национальный округ, на восточном склоне к оз. Опека (басс. р. Нижней Тунгуски) – 66° с.ш. и 62° [$92^{\circ}19'34''$] в.д., 9 VII 1935, А.З. Ломакин (ТК-004723).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Роасеае для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе для определения разновидностей *Poa pratensis*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 7 образцов, представляющих рассматриваемую разновидность. Все образцы имеют определительную этикетку автора разновидности В.В. Ревердатто: «*Poa pratensis* var. *pseudovulgaris* m.» или «*Poa pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd.». Валидируя здесь название «*Poa pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd.», образец ТК-004717, наиболее подходящий по признакам к описанной разновидности, мы цитируем как голотип, остальные образцы – как паратипы.

***Poa stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd., var. nova.**

– *Poa stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyar. Kraja, 2: 82, publ. inval., descr. ross., sine typo.

Validating description: Spikelets 2.5–3 mm long, 2–3-flowered, panicle often one-sided, mostly green.

Holotype [Krasnoyarsk Territory]: Minusinsky district, between villages Innokentievskiy and Novo-Rozhdestvenka, steppe slopes, 6 VIII 1926, E. Vandakurova (ТК: ТК-004724).

Paratypes [Republic of Khakasia]: Yenisei province, Abakan foreign council, vicinity of ulus Apkashiev, feather-grass steppe, 23–25 VIII 1909, V. Titov (ТК: ТК-004725); [Republic of Khakasia]: Khakassia, 12 km to the west from the village Bateni, mountain Bei-Buluk, 17 VIII 1936, V.V. Reverdatto (ТК: ТК-004726); Krasnoyarsk Territory, Western Sayan, Goliy Ridge, upper of Uzun-Suk River, N 52° , E 61° [$91^{\circ}19'34''$], rocky slope, 23 VIII 1937, S.I. Gluzdakov (ТК: ТК-004727); [Krasnoyarsk Territory]: Minusinsk expedition by prof. Reverdatto V.V. 1926. Minusinsky district, Yenisei River, right bank in the 6 verst above Komscoe, shady forest rocks, 5 VIII 1926, V.V. Reverdatto (ТК: ТК-004728); [Republic of Khakasia]: Former Minusinsk county, Abakansky district, vicinity of village Algashtyk, N $54\frac{2}{3}^{\circ}$, E $61\frac{1}{4}^{\circ}$ [$91^{\circ}34'34''$], forest meadow. Goszemtrest Expedition, 12 VII 1931, A. Konusova and N. Yakubova (ТК: ТК-004729); [Republic of Khakasia]: Khakass region, Uzhursky district, Uchum-Sovkhoz, N $55\frac{1}{2}^{\circ}$, E $59\frac{1}{2}^{\circ}$ [$89^{\circ}49'34''$], uncultivated arable land. Goszemtrest Expedition, 3 VIII 1932, V.V. Reverdatto and Z. Kurakina (ТК: ТК-004730).

Колоски 2,5–3 мм длины, 2–3 цветковые. Метёлка нередко однобокая, большей частью зелёная.

Голотип [Красноярский край]: Минусинский округ, между с. Иннокентьевским и д. Ново-Рождественкой, степные склоны, 6 VIII 1926, Е. Вандакурова (ТК: ТК-004724).

Паратипы [Республика Хакасия]: Енисейская губерния, Абаканская инородная управа, окр. улуса Апкашева, ковыльная степь, 23–25 VIII 1909, В. Титов (ТК: ТК-004725), [Республика Хакасия]: Хакасия, в 12 км от с. Батени на запад, гора Бей-Булак, 17 VIII 1936, В.В. Ревердатто (ТК: ТК-004726); Красноярский край, Западные Саяны, хребет Голый, верховье р. Узун-Сук, 52° с.ш. и 61° [91°19'34"] в.д., каменистый склон, 23 VIII 1937, С.И. Глуздаков (ТК: ТК-004727); [Красноярский край]: Минусинская экспедиция проф. Ревердатто В.В. 1926 г. Минусинский округ, р. Енисей, правый берег в 6 в. выше Комского, тенистые лесные скалы, 5 VIII 1926, В.В. Ревердатто (ТК: ТК-004728); [Республика Хакасия]: Бывший Минусинский округ, Абаканский район, окр. дер. Алгаштык, 54 $\frac{2}{3}$ ° с.ш. и 61 $\frac{1}{4}$ ° [91°34'34"] в.д., лесной луг. Экспедиция Госземтреста, 12 VII 1931, А. Конусова и Н. Якубова (ТК: ТК-004729); Хакасская обл., Ужурский р-н, Учум-Совхоз, 55 $\frac{1}{6}$ ° с.ш. и 59 $\frac{1}{2}$ ° [89°49'34"] в.д., залежь. Экспедиция Госземтреста, 3 VIII 1932, В.В. Ревердатто и З. Куракина (ТК: ТК-004730).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название сопровождалось кратким описанием на русском языке, не был ясно указан тип. В ТК имеется 7 образцов, представляющих рассматриваемую разновидность. Все образцы имеют определительную этикетку автора разновидности В.В. Ревердатто: «*Poa stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* m.» или «*Poa stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd.». Валидизируя здесь название *Poa stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd., образец ТК-004724, наиболее подходящий по признакам к описанной разновидности, мы цитируем как голотип, остальные образцы являются паратипами.

Название ещё одной разновидности, предложенное В.В. Ревердатто в цитированной работе, – *Poa altaica* Trin. var. *angustifolia* Reverd. (Reverdatto, 1964: 80) мы не валидизируем, поскольку оно является более поздним омонимом названия, опубликованного во «Flora Rossica» (Ledebour, 1853), – *Poa altaica* Trin. β. *angustifolia* Ledeb. (Tropicos, 2023). Не валидизируем также названия *Poa palustris* L. f. *tristis* Reverd. и *Poa pratensis* f. *arida* Reverd.

ЛИТЕРАТУРА

- Ревердатто В.В. Злаковые – Gramineae // Флора Красноярского края. Т. 2: Злаковые – Gramineae. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1964. С. 1–139.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. URL: <http://www.ipni.org> (дата обращения: 17.03.2023).
- Ledebour C.F. Flora Rossica sive enumeration plantarum in totus Imperii Rossici. Stuttgartiae, 1953. Vol. 4. 1–741.
- Tropicos. Missouri Botanical Garden. URL: <https://tropicos.org/name/25550315> (дата обращения: 17.03.2023).

Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F. (eds.). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, Shenzhen, China, July 2017. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018. 254 p. (Regnum Vegetabile 159). <https://doi.org/10.12705/Code.2018>

Поступила в редакцию 17.03.2023

Принята к публикации 22.05.2023

Цитирование: Олонова М.В., Гуреева И.И. Валидизация названий внутривидовых таксонов *Poa* L. (Poaceae), описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири // Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. 2023. № 127. С. 28–37. <https://doi.org/10.17223/20764103.127.3>



Systematic notes..., 2023, 127: 28–37
<https://doi.org/10.17223/20764103.127.3>

Validation of the names of intraspecific taxa of *Poa* L. (Poaceae) described by V.V. Reverdatto from Yenisei Siberia

M.V. Olonova*, I.I. Gureyeva

Tomsk State University, Tomsk, Russia

*Author for correspondence: olonova@list.ru

Abstract. The names of seven intraspecific taxa of five species of the genus *Poa* L. described by V.V. Reverdatto from Yenisei Siberia are validated: *P. dahurica* Trin. var. *paupera* Reverd., *P. glauca* Vahl var. *gracilis* Reverd., *P. nemoralis* L. var. *tenuifolia* Reverd., *P. pratensis* var. *caespitosa* Reverd., *P. pratensis* L. var. *lilacina* Reverd., *P. pratensis* var. *pseudovulgaris* Reverd., *P. stepposa* (Krylov) Roshev. var. *parviflora* Reverd.

Key words: varieties, validation, *Poa* L., Poaceae

Funding: The study was supported by the Tomsk State University Development Programme (Priority-2030).

REFERENCES

- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. URL: <http://www.ipni.org>. Accessed: 17 March 2023.
- Ledebour C.F. 1953. Flora Rossica sive enumeration plantarum in totus Imperii Rossici. Stuttgartiae, 4: 1–741.
- Reverdatto V.V. 1964. Gramineae. In: Flora Krasnoyarskogo kraya [Flora of Krasnoyarsk Territory]. Vol. 2. Gramineae. Tomsk: Tomsk University Publ.: 1–139. [In Russian].
- Tropicos. Missouri Botanical Garden. URL: <https://tropicos.org/name/25550315>. Accessed: 17 March 2023.

Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, Shenzhen, China, July 2017. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 254 p. (Regnum Vegetabile 159). <https://doi.org/10.12705/Code.2018>

Received 17 March 2023

Accepted 22 May 2023

Citation: Olonova M.V., Gureyeva I.I. 2023. Validation of the names of intraspecific taxa of *Poa* L. (Poaceae) described by V.V. Reverdatto from Yenissei Siberia. *Sistematicheskie zametki po materialam Gerbariya im. P.N. Krylova Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University], 127: 28–37. <https://doi.org/10.17223/20764103.127.3>