

УДК 582.52

## Валидизация названий внутривидовых таксонов *Festuca* L. (Poaceae), описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири

М.В. Олонова\*, И.И. Гуреева

Томский государственный университет, Томск, Россия

\*Автор для переписки: [olonova@list.ru](mailto:olonova@list.ru)

**Аннотация.** Валидизированы названия 3 разновидностей и 5 форм 5 видов рода *Festuca* L. (Poaceae Barnhart), описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири.

**Ключевые слова:** разновидности, валидизация, *Festuca*, Poaceae

Обрабатывая злаки для «Флоры Красноярского края», В.В. Ревердатто (Reverdatto, 1964) привёл 8 новых внутривидовых таксонов (3 разновидности и 5 форм) 5 видов рода *Festuca* L. (Poaceae Barnhart). Все внутривидовые таксоны опубликованы без соблюдения правил, необходимых для действительного обнародования названий: с 1 января 1935 г. название должно сопровождаться латинским диагнозом, с 1 января 1958 г. необходимо иметь ясное указание типа (Turland et al., 2018: Art. 40.1). У всех рассматриваемых внутривидовых таксонов рода *Festuca* отсутствует ясное указание типа, у некоторых таксонов имеются краткие описания на латинском и русском языках, некоторые таксоны приведены только в определительных ключах на русском языке. Таким образом, названия разновидностей и форм не являются действительно обнародованными, поэтому требуется их валидизация.

Ниже мы валидируем названия 8 внутривидовых таксонов рода *Festuca*, приводя описания на английском языке, что возможно с 1 января 2012 г., указав голотипы и место их хранения (Turland et al., 2018: Art. 39.2, 40.1, 40.7), в некоторых случаях цитируем также другие типовые образцы, для чего использован оригинальный материал с пометками В.В. Ревердатто. В качестве диагноза тех таксонов, которые приведены на русском языке, иногда только в определительных ключах в обработке рода *Festuca* во «Флоре Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964), приводим переведённые на английский язык несколько расширенные описания. Авторство названий оставляем за В.В. Ревердатто, которому оно было приписано в этой публикации (Turland et al., 2018: Art. 46.2). Разновидности и формы относим к тем же видам, к которым они были отнесены В.В. Ревердатто.

Написания фамилий авторов таксонов скорректированы по «IPNI. International Plant Name Index» (IPNI: <http://www.ipni.org>). Таксоны перечислены в алфавитном порядке названий видов, разновидностей и форм.

При цитировании этикеток образцов, в случае указания на них координат, указание минут в дробях от градуса переведено в минуты. Указание восточной долготы по Пулковскому меридиану пересчитано по Гринвичскому (к значению, указанному на этикетке прибавлено  $30^{\circ}19'34''$ ), оригинальное написание координат не приводится. Указание даты унифицировано: для всех образцов месяц обозначен римскими цифрами. В квадратных скобках указан субъект Российской Федерации по современному административному делению, названия районов не изменены.

***Festuca jensiseensis* Reverd. f. *aristata* Reverd., forma nova.**

– *Festuca jensiseensis* Reverd. f. *aristata* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 106, publ. invalid., descr. ross., sine typo.

**Validating description:** Plants densely caespitose, culms (15) 25–45 cm. Panicles dense, contracted, 2.5–4 cm. Lemmas 4–5 mm long, with awns up to 2.5–3 mm long.

**Holotype:** [Republic of Khakasia]: Kuznetskiy Alatau, Ust-Abakanskiy district, vicinity of Ulen mine,  $54^{\circ}06' N$ ,  $89^{\circ}40' E$ , valley of the Ulen river, south slope, mixed herbs steppe, 5 VII 1936 [fr.], K.A. Sobolevskaya (TK: TK-005951).

Плотно-дерновинные растения, стебли (15) 25–45 см. Метёлки плотные, сжатые, 2,5–4 см дл. Нижние цветковые чешуи 4–5 мм дл., с остями до 2,5–3 мм.

**Голотип:** [Республика Хакасия]: Кузнецкий Алатау, Усть-Абаканский р-н. Окр. рудника Улень,  $54^{\circ}06' \text{ }^{\circ}$  с.ш. и  $89^{\circ}40' \text{ }^{\circ}$  в.д., долина р. Улень, южный склон, степь разнотравная, 5 VII 1936 [пл.], К.А. Соболевская (TK: TK-005951).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 1 образец, представляющий рассматриваемую форму. Образец имеет определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca jensiseensis* Reverd. f. *aristata* m.». Валидируя здесь название *Festuca jensiseensis* Reverd. f. *aristata* Reverd., мы цитируем образец как голотип.

***Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb. f. *aristata* Reverd., forma nova.**

– *Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb. var. *angustiflora* (Hack.) Reverd. f. *aristata* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 106, publ. invalid., descr. ross., sine typo.

**Validating description:** Plants densely caespitose, culms 30–55 cm. Spikelets 3–7 mm long, lemmas 2.5–4 mm long, with awns up to 2.5–3.5 mm long.

**Holotype:** [Republic of Khakasia]: Kuznetskiy Alatau, Ust-Abakanskiy district, vicinity of Ulen mine,  $54^{\circ}06' N$ ,  $89^{\circ}40' E$ , valley of the Ulen river, south slope, mixed herbs steppe, 5 VII 1936 [fr.], K.A. Sobolevskaya (TK: TK-005955).

**Paratypes** (2): Khakass district. Vicinity of Bozhje lake, western bank, southern rocky slope, 5 VII 1929 [fr.], V. Golubintseva (TK-005954); [Krasnoyarsk Territory]: vicinity of Krasnoyarsk city, the Laletina river, rocky slopes of valley, 10–19 VI 1939 [fl.], V. Nashchokin (TK: TK-005956).

Плотнoderновинные растения, стебли 30–55 см дл. Колоски 3–7 см дл., нижние цветковые чешуи 2,5–4 мм дл., с остью до 2,5–3,5 мм дл.

**Голотип**: [Республика Хакасия]: Кузнецкий Алатау, Усть-Абаканск. р-н, Окр. рудн. Улень, 54°06' с.ш. и 89°40' в.д., долина р. Улень, южный склон, степь разнотравная, 5 VII 1936 [пл.], К.А. Соболевская (TK: TK-005955).

**Паратипы** (2): [Республика Хакасия]: Окр. оз. Божьего, западный берег, южный каменистый склон, 5 VII 1929 [пл.], В. Голубинцева» (TK: TK-005954); [Красноярский край]: окр. г. Красноярска, р. Лалетина, каменистые склоны долины, 10–19 VI 1939 [цв.], В. Нащокин (TK: TK-005956).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был ясно указан тип. В ТК имеется 3 образца, представляющих рассматриваемую форму. Образцы имеют определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca pseudovina* Hackl. f. *aristata* m.», «*Festuca pseudovina* Hackl. var. *angustiflora* (Hack.) Reverd. f. *aristata* m. Teste: V. Reverdatto», «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca pseudovina* Hackl. var. *angustiflora* (Hack.) Reverd. f. *aristata* m.». Валидизируя здесь название *Festuca pseudovina* Hackl. f. *aristata* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, еще два – как паратипы.

***Festuca rubra* L. var. *ciliata* Reverd., var. nova.**

– *Festuca rubra* L. var. *ciliata* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 109, publ. invalid., descr. ross. in clavi, sine typo.

**Validating description**: Lower leave blades setiforme or conduplicate. Glumes margins more or less ciliate, sometimes ciliate along keels as well. Upper glumes 4–4.5 mm long, sharp, lanceolate. Lemmas narrow-lanceolate, villous.

**Holotype**: [Republic of Khakasia]: Charkovskiy district, vicinity of ulus Katizhekov – 53°40' N, 91°19'34" E, croplands, fallow lands, 28 VI 1933 [fl.], V.V. Reverdatto, V. Golubintseva, T. and Z. Kurakins (TK: TK-005957).

**Paratypes** (4): [Republic of Khakasia]: Charkovskiy district, between uluses Shoev and Kyshtymov – 53°40' N and 91°19'34" E, meadows, 13 VII 1933 [fr. imm.], V.V. Reverdatto, V. Golubintseva, T. and Z. Kurakins (TK: TK-005958); [Krasnoyarsk Territory]: Minusinsk district, the Yenissei river, Koryakovskiy island opposite village Sysim, soundy flood meadow, 25 VI 1926 [fr. imm.], [V.V. Reverdatto] (TK: TK-005959); [Republic of Khakasia]: Mountains to the West from the Kamyshhta river, the Bulan-Kul lake, birch-larch forest at the lake vicinity, 26 VII 1926 [fr. imm.], [V.V. Reverdatto] (TK: TK-005960); [Republic of Khakasia]: The Abakan river, meadows on the island opposite village Askyz, 14 VII 1927 [fr.], [V.V. Reverdatto] (TK: TK-005961).

Нижние листья щетиновидные или свёрнутые. Колосковые чешуи по краям более или менее реснитчатые, нередко по килю также с ресничками. Верхняя колосковая чешуя 4–4,5 мм длины, острая, ланцетная. Цветковые чешуи узколанцетные, опушённые.

Голотип: [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Ревердатто В.В. Чарковский район, окр. ул. Катижеева, 53°40' с.ш. и 91°19'34" в.д., пахотные угодья, залежи, 28 VI 1933, В.В. Ревердатто, В. Голубинцева, Т. и З. Куракины (ТК: ТК-005957).

Паратипы (4): [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Ревердатто В.В. Чарковский район, между ул. Шоевым и Кыштымным, 53°40' с.ш. и 91°19'34" в.д., луга, 13 VII 1933 [пл. незрел.], В.В. Ревердатто, В. Голубинцева, Т. и З. Куракины (ТК: ТК-005958); [Красноярский край]: Минусинская экспедиция проф. Ревердатто В.В. 1926 г. Минусинский округ, р. Енисей, остров Коряковский против с. Сисим, песчаный заливной луг, 25 VI 1926 [пл. незрел.], [В.В. Ревердатто] (ТК: ТК-005959); [Республика Хакасия]: Минусинская экспедиция проф. Ревердатто В.В. 1926 г. Горы на запад от р. Камышты, оз. Булан-Кюль, березово-лиственничный лес в окр. озера, 26 VII 1926 [пл. незрел.], [В.В. Ревердатто] (ТК: ТК-005960); [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Ревердатто В.В. 1927 г. Р. Абакан, луга на острове против с. Аскыз, 14 VII 1927 [пл.], [В.В. Ревердатто] (ТК: ТК-005961).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Роасеае для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе для определения разновидностей *F. rubra*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был указан тип. В ТК имеется 4 образца, представляющих рассматриваемую разновидность. Каждый образец имеет определительную этикетку автора названия В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca rubra* L. var. *ciliata* m.». Валидируя здесь название *Festuca rubra* L. var. *ciliata* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, еще четыре – как паратипы.

***Festuca rubra* L. var. *hirta* Reverd., var. nova.**

– *Festuca rubra* L. var. *hirta* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 110, publ. invalid., descr. ross. in clavi, sine typo.

Validating description: Glumes glabrous. Upper glume 4–4.5 mm long, sharp, lanceolate. Lemmas narrow-lanceolate, rarely pilose.

Holotype: [Krasnoyarsk Territory]: Evenk country, the Agata lake near the Severnaya river source, 67°15' N, 92°39'34" E, 4 IX 1935 [fr.], A.Z. Lomakin (ТК: ТК-005963).

Paratype: [Republic of Khakasia]: Charkovskiy district, between uluses Tuguzhekov and Kyshtymov, 53°30' N., 90°39'34" E, saline meadow, 4 VII 1933 [fr. imm.], V.V. Reverdatto, V. Golubintseva, T. and Z. Kurakins (ТК: ТК-005962).

Колосковые чешуи голые. Верхняя колосковая чешуя 4–4,5 мм длины, острая, ланцетная. Нижние цветковые чешуи узколанцетные, коротко-, жёстко- и редковолосистые.

Голотип: [Красноярский край]: Эвенкийский округ, оз. Агата у истоков р. Северной, 67°15' с.ш. и 92°39'34" в.д. 4 IX 1935 [пл.], А.З. Ломакин (ТК: ТК-005963).

Паратип: [Республика Хакасия]: Абаканская экспедиция проф. Ревердатто В.В. Чарковский район, между ул. Тугужековым и ул. Кыштымным, 53°30' с.ш. и 90°39'34" в.д., солончаковый луг, 4 VII 1933 [пл. незрел.], В.В. Ревердатто, В. Голубинцева, Т. и З. Куракины (ТК: ТК-005962).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Роасеае для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964) в ключе

для определения разновидностей *F. rubra*. Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был указан тип. В ТК имеются 2 образца, представляющих рассматриваемую разновидность. Образцы имеют определительные этикетки автора названия В.В. Ревердатто: «*V. Reverdatto. Notae criticae. Festuca rubra* L. var. *vulgaris* Gaud. f. *hirta* m.» (голотип) и «*V. Reverdatto. Notae criticae. Festuca rubra* L. var. *hirta* m.» (паратип). Валидизируя здесь название *Festuca rubra* L. f. *hirta* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, другой – как паратип.

***Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd., var. nova.**

– *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 103, publ. invalid., sine typo.

**Validating description:** Culms 25–100 cm, green. Leaf blades very narrow, 0.2–0.4 mm, soft, mainly long; sheathes closed for the  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$  their length. Spikelets green, lemmas very narrow.

**Holotype:** [Krasnoyarsk Territory]: Turukhanskiy district, the Taz river at the mouth of tributary the Matylky river, 62°30' N. 86°19'34" E, near the buildings on the place of whittled forest, 7–10 VII 1936 [fr. imm.], M.F. Zharkova (TK: TK-002234).

**Paratypes** (6): [Krasnoyarsk Territory]: Evenk county, the Tutochany river, at the floodplain of the upper part of its middle reach (the Nizhnyaya Tunguska basin), 66°40' N, 93°19'34" E, 21 VII 1935 [fr.], A.Z. Lomakin (TK: TK-002235); [Krasnoyarsk Territory]: Evenk county, the Nizhnyaya Tunguska basin, head of the Tutochany river, at the floodplain on the moss bog, 67° N, 92°49'34" E, 23 VII 1935 [fr.], A.Z. Lomakin (TK: TK-002236); [Krasnoyarsk Territory]: Evenk county, valley of the Taimura river, 40–45 km upwards the river mouth, 23–25 VIII 1935 [fr.], N.N. Grakhov (TK: TK-002237); [Krasnoyarsk Territory]: Kansk county, vicinity of Kansk city, pine forest, 25 VI 1930 [fr.], K. Poluyakhtov (TK: TK-002238); [Krasnoyarsk Territory]: Evenk county, basin of the Kamanda river (right tributary of the Nizhnyaya Tunguska, 65°55' N, 104°19'34" E, bank of the Padushka river, 25–26 VII 1935 [fr.], L. Shumilova and L. Obolentsev (TK: TK-002239); [Krasnoyarsk Territory]: Evenk county, the Nyakshinda lake, on the coastal coarse sand bank near the trading, 67°15' N 93°04'34" E, 1 VIII 1935 [fr.], A.Z. Lomakin (TK: TK-005857).

Растения 25–100 см, зелёные. Листья очень узкие, 0,2–0,4 мм, мягкие, большей частью длинные, влагалища спаянные на  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ . Колоски зелёные, с очень узкими цветковыми чешуями.

**Голотип:** [Красноярский край]: Туруханский район, река Таз в устье прит. р. Матылькы, 62°30' с.ш. и 86°19'34" в.д., у построек на месте сведённого леса, 7–10 VII 1936 [пл. незрел.], М.Ф. Жаркова» (TK: TK-002234).

**Паратипы** (6): [Красноярский край]: Эвенкийский округ, р. Тутончаны, в пойме верхней части среднего течения (басс. Нижней Тунгуски), 66°40' с.ш. и 93°19'34" в.д. 21 VII 1935 [пл.], А.З. Ломакин (TK: TK-002235); [Красноярский край]: Эвенкийский округ (басс. Нижней Тунгуски), верховья р. Тутончаны, в пойме на моховом покрове, 67° с.ш. и 92°49'34" в.д., 23 VII 1935 [пл.], А.З. Ломакин» (TK: TK-002236); [Красноярский край]: Эвенкийский округ, долина р. Таймуры, в 40–45 км выше устья, 23–25 VIII 1935, Н.Н. Грахов (TK: TK-002237); [Красноярский край]: Канский округ, окр. г. Канска, сосновый бор, 25 VI 1930 [пл.], К. Полуяктов (TK: TK-002238); [Красноярский край]: Эвенкийский округ, бассейн р. Каманды (правый приток Нижней Тунгуски), 65°55' с.ш. и 104°19'34" в.д., берега реч. Падушки, 25–26 VII 1935 [пл.], Л. Шумилова и Л. Оболенцев» (TK:

TK-002239); [Красноярский край]: Эвенкийский округ, оз. Някшинда, на прибрежном крупнопесочном валу у фактории, 67°15' ° с.ш. и 93°04'34" в.д., 1 VIII 1935 [пл.], А.З. Ломакин (TK: TK-005857).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название сопровождалось русским и менее подробным латинским диагнозом, но тип не был указан. В ТК имеется 7 образцов, представляющих рассматриваемую разновидность. Каждый образец имеет определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* m.» Валидизируя здесь название *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, еще шесть – как паратипы. В.В. Ревердатто (Reverdatto, 1964) считал, что эта форма возникла в перигляциальной зоне и осталась в лесостепях и степях Приенисейской Сибири как перигляциальный реликт.

***Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd. f. *foliosa* Reverd., forma nova.**

– *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd. f. *foliosa* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 103, publ. invalid., descr. ross., sine typo.

Validating description: Leaf blades equal or longer than culm.

Holotype: [Krasnoyarsk Territory]: Rybinsk district, vicinity of Churinovo settlement, 55°39' N, 94°51'34" E, mixed herbs steppes at the ancient floodplain of the Rybnaya river, 5 VIII 1939 [fr.], L.B. Kolokolnikov (TK: TK-002232) et isotype (TK: TK-002233).

Листья, по длине достигающие или превышающие стебель.

Голотип: [Красноярский край]: Рыбинский район, окр. с. Чуриново, 55°39' с.ш. и 94°51'34" в.д., разнотравные степи в древней пойме р. Рыбной, 5 VIII 1939 [пл.], Л.Б. Колокольников» (TK: TK-002232) и изотип (TK: TK-002233).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название не сопровождалось латинским диагнозом, не был указан тип. В ТК имеются 2 образца, представляющих рассматриваемую форму. Каждый образец имеет определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* m. f. *foliosa* m.» Валидизируя здесь название *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd. f. *foliosa* Reverd., один из них мы цитируем как голотип, другой, представляющий часть того же сбора, – как изотип.

***Festuca valesiaca* Schleich. f. *aristata* Reverd., forma nova.**

– *Festuca valesiaca* Schleich. f. *aristata* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 104, publ. invalid., sine typo.

Holotype: [Republic of Khakasia]: Shira district, vicinity of settlement Kopyovo, 55° N, 89°39'34" E, upland meadow, 20 VI 1935 [fr.], S.P. Abramov (TK: TK-005964).

Голотип: «[Республика Хакасия]: Ширинский р-н, окр. с. Копьево, 55° с.ш. и 89°39'34" в.д., суходольный луг, 20 VI 1935 [пл.], С.П. Абрамов» (TK: TK-005964).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название сопровождалось кратким латинским диагнозом, но не был указан тип. В ТК имеется 1 образец, представляющий рассматриваемую форму и имеющий определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «V. Reverdatto. Notae criticae. *Festuca valesiaca* Schleich. f. *aristata* m.». Валидизируя здесь название *Festuca valesiaca* Schleich. f. *aristata* Reverd., мы цитируем этот образец как голотип.

***Festuca valesiaca* Schleich. f. *foliosa* Reverd., forma nova.**

– *Festuca valesiaca* Schleich. f. *foliosa* Reverd., 1964, Fl. Krasnoyarsk. kraja, 2: 105, publ. invalid., sine typo.

Г о л о т и п: [Republic of Khakasia]: Between uluses Podkunin and Ust-Bidzhe. Mountains Kun at the steppe to the north from the Abakan river, tops of the rocky hills and cliffs, 22 VII 1924 [fr.]. V. and L. Reverdatto (TK: TK-005965).

Г о л о т и п: [Республика Хакасия]: Между ул. Подкуниным и ул. Усть-Биджэ, горы Кунь в степи севернее р. Абакана, вершины каменистых сопок и скалы. 22 VII 1924 [пл.], В. и Л. Ревердатто» (TK: TK-005965).

Название опубликовано В.В. Ревердатто в обработке семейства Poaceae для «Флоры Красноярского края» (Ревердатто / Reverdatto, 1964). Название сопровождалось кратким латинским диагнозом, но не был указан тип. В ТК имеется 1 образец, представляющий рассматриваемую форму и имеющий определительную этикетку автора таксона В.В. Ревердатто: «*Festuca valesiaca* Schleich. f. *foliosa* m. Teste: V. Reverdatto». Валидизируя здесь название *Festuca valesiaca* Schleich. f. *foliosa* Reverd., мы цитируем этот образец как голотип.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Reverdatto V.V. Festuca* L. Овсяница // Флора Красноярского края. Злаковые – Gramineae. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1964. Т. 2. С. 99–112.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. URL: <http://www.ipni.org> (дата обращения: 10.05.2024).
- Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F.* (eds.). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, Shenzhen, China, July 2017. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018. 254 p. (Regnum Vegetabile 159). <https://doi.org/10.12705/Code.2018>.

Поступила в редакцию 17.05.2024

Принята к публикации 20.06.2024

**Цитирование:** Олонова М.В., Гуреева И.И. Валидизация названий внутривидовых таксонов *Festuca* L. (Poaceae), описанных В.В. Ревердатто из Приенисейской Сибири // Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. 2024. № 129. С. 18–25. <https://doi.org/10.17223/20764103.129.3>

## Validation of the names of intraspecific taxa of *Festuca* L. (Poaceae) described by V.V. Reverdatto from Yenisei Siberia

M.V. Olonova<sup>\*</sup>, I.I. Gureyeva

Tomsk State University, Tomsk, Russia

<sup>\*</sup>Author for correspondence: [olonova@list.ru](mailto:olonova@list.ru)

**Abstract.** The names of seven intraspecific taxa of five species of the genus *Festuca* L. (Poaceae Barnhart) described by V.V. Reverdatto from Yenisei Siberia are validated: *Festuca jennisseeensis* Reverd. f. *aristata* Reverd., *Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb. f. *aristata* Reverd., *Festuca rubra* L. var. *ciliata* Reverd., *Festuca rubra* L. var. *hirta* Reverd., *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd., *Festuca supina* Schur var. *postglacialis* Reverd. f. *foliosa* Reverd., *Festuca valesiaca* Schleich. f. *aristata* Reverd., *Festuca valesiaca* Schleich. f. *foliosa* Reverd.

**Key words:** varieties, validation, *Festuca*, Poaceae

### REFERENCES

- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. URL: <http://www.ipni.org>. Accessed: 10 May 2024.
- Reverdatto V.V. 1964. *Festuca* L. In: Flora Krasnoyarskogo kraya [Flora of Krasnoyarsk Territory]. Vol. 2. Gramineae. Tomsk: Tomsk University Publ., 2: 99–112. [In Russian].
- Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, Shenzhen, China, July 2017. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 254 p. (Regnum Vegetabile 159). <https://doi.org/10.12705/Code.2018>

Received 17 May 2024

Accepted 20 June 2024

**Citation:** Olonova M.V., Gureyeva I.I. 2024. Validation of the names of intraspecific taxa of *Festuca* L. (Poaceae) described by V.V. Reverdatto from Yenisei Siberia. *Sistemicheskie zametki po materialam Gerbariya im. P.N. Krylova Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University], 129: 18–25. <https://doi.org/10.17223/20764103.129.3>